

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Receptal 4 Mikrogramm/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Buserelin 4 Mikrogramm/ml (entspricht 4,2 Mikrogramm/ml Buserelinacetat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Durchstechflasche zu 2,5 ml
5 Durchstechflaschen zu 2,5 ml
10 Durchstechflaschen zu 2,5 ml
1 Durchstechflasche zu 5 ml
5 Durchstechflaschen zu 5 ml
10 Durchstechflaschen zu 5 ml
1 Durchstechflasche zu 10 ml
5 Durchstechflaschen zu 10 ml
10 Durchstechflaschen zu 10 ml
1 Durchstechflasche zu 50 ml
5 Durchstechflaschen zu 50 ml
10 Durchstechflaschen zu 50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh, Färse), Pferd (Stute), Kaninchen (weiblich), Schwein (Sau, Jungsau), Forelle.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder, Pferde, Schweine, Kaninchen: Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung.
Forellen: Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Pferde

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

Schweine, Kaninchen

Essbare Gewebe: Null Tage.

Forellen

Essbare Gewebe: Null Gradtage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie die Packungsbeilage vor der Anwendung.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet International B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V118781 (Durchstechflaschen aus Glas Typ I)

BE-V665323 (Durchstechflaschen aus Glas Typ II)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**ETIKETT DURCHSTECHFLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Receptal

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Buserelin 4 µg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: _____