

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel für Flaschen mit 50 ml oder 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Covexin 10 Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml des Impfstoffes:

<i>C. perfringens</i> type A toxoid	≥ 0,9 E
<i>C. perfringens</i> type B & C (β) toxoid	≥ 12,4 E
<i>C. perfringens</i> type D (ε) toxoid	≥ 5,1 E
<i>C. chauvoei</i> Vollkultur inaktiviert	conf. Ph. Eur.
<i>C. novyi</i> toxoid	≥ 1,2 E
<i>C. septicum</i> toxoid	≥ 3,6 E
<i>C. tetani</i> toxoid	≥ 2,5 E
<i>C. sordellii</i> toxoid	≥ 0,8 E
<i>C. haemolyticum</i> toxoid	≥ 16,5 E

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml**4. ZIELTIERART(EN)**

Schafe und Rinder

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Das Flasche im Umkarton aufbewahren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V265894

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Flasche mit 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Covexin 10 Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml des Impfstoffes:

<i>C. perfringens</i> type A toxoid	≥ 0,9 E
<i>C. perfringens</i> type B & C (β) toxoid	≥ 12,4 E
<i>C. perfringens</i> type D (ε) toxoid	≥ 5,1 E
<i>C. chauvoei</i> Vollkultur inaktiviert	conf. Ph. Eur.
<i>C. novyi</i> toxoid	≥ 1,2 E
<i>C. septicum</i> toxoid	≥ 3,6 E
<i>C. tetani</i> toxoid	≥ 2,5 E
<i>C. sordellii</i> toxoid	≥ 0,8 E
<i>C. haemolyticum</i> toxoid	≥ 16,5 E

100 ml

3. ZIELTIERART(EN)

Schafe und Rinder

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Das Flasche im Umkarton aufbewahren.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Flasche mit 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Covexin 10

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

C. perfringens type A toxoid
C. perfringens type B & C (β) toxoid
C. perfringens type D (ϵ) toxoid
C. chauvoei Vollkultur inaktiviert
C. novyi toxoid
C. septicum toxoid
C. tetani toxoid
C. sordellii toxoid
C. haemolyticum toxoid

50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.