



ETIQUETA/PROSPECTO

C.N.: xxxxxx.x

1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES.

DIVASA-FARMAVIC, S.A.
Ctra. Sant Hipòlit, km 71
08503 GURB-VIC
Barcelona

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TABERDOG SPRAY TETRAMETRINA - BUTÓXIDO DE PIPERONILO
Solución para pulverización cutánea.

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Tetrametrina (20:80)	1,5 mg
Butóxido de piperonilo	8 mg
Excipiente + Propelente c.s.p.	1 g

4. INDICACIONES DE USO

Tratamiento y prevención de ectoparasitosis en los perros.

4. CONTRAINDICACIÓN(ES)

No se han descrito.

5. REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en esta etiqueta, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

6. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

7. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Uso cutáneo.

Administración mediante pulverización: pulsar sobre el cuerpo del animal durante unos segundos, a contrapelo, manteniendo el frasco aerosol a unos 30-40 cm de distancia del animal a tratar. Repetir cada 5 días.

8. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-03

Agítese antes de usar. Evitar su aplicación sobre ojos y mucosas.

9. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación, a excepción de las aplicables a los envases presurizados con gas licuado que son:

Mantener protegido de la luz solar directa o focos de ignición, no exponerlo a temperaturas superiores a 45°C.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos

11. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Este medicamento no contiene ningún conservante antimicrobiano.

Precauciones especiales para su uso en animales:

No precisa.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.

Envase a presión.

No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 45°C.

Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.

Las personas con hipersensibilidad conocida a los piretroides deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Debe evitarse el contacto con la piel, mucosas y ojo. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.

Si por un empleo incorrecto o accidentalmente se produjeran intoxicaciones, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o etiqueta.

No comer, fumar ni beber durante la utilización.

Lavarse las manos después de administrar el medicamento a los animales.

Otras precauciones

La tetrametrina es tóxica para los organismos acuáticos. No se debe permitir que los perros tratados entren en aguas superficiales durante las 48 horas tras el tratamiento, y así evitar efectos adversos sobre los organismos acuáticos.

Uso durante la gestación y la lactancia:

No se han descrito contraindicaciones durante estos períodos.

Interacciones con otros medicamentos:

Los inhibidores de esterasas y oxidasas (como los insecticidas organofosforados) potencian su acción al disminuir la detoxicación.

Sobredosificación

Por la forma de aplicación es improbable que se produzca una sobredosificación.



Los síntomas de intoxicación son excitación y convulsiones que progresan a parálisis y fibrilación muscular pudiéndose producir la muerte por insuficiencia respiratoria.

Como tratamiento pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón activado.

En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el pentobarbital. Impedir la ingestión de aceites y grasa porque se favorecería la absorción a nivel intestinal.

Incompatibilidades

Ninguna conocida.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Procontrol spray tetrametrina y butóxido de piperonilo no deberá entrar en contacto con cursos de agua puesto que podría resultar peligroso para los peces y otros organismos acuáticos.

No perforar el envase ni arrojárselo al fuego, ni incluso vacío.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

3 de noviembre de 2014

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE.

Uso veterinario – medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

LA MENCIÓN “MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños

NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Nº de registro: 354 ESP

NÚMERO DEL LOTE DE FABRICACIÓN Y FECHA DE CADUCIDAD

Lote nº: xxxx/xx

CAD: XX/XX

OTROS DATOS

Símbolo de una llama y la frase “EXTREMADAMENTE INFLAMABLE (F+)”

Presentaciones comerciales:

- Frasco aerosol de 405 ml:



Contiene: volumen neto 300 ml. Peso neto: 208,08 g.

- Frasco aerosol de 520 ml:

Contiene: volumen neto 400 ml. Peso neto: 245,81 g.