

BIJSLUITER

(Alle informatie van de bijsluiters staat op het etiket/de buitenverpakking)

Alcide UDDERgold PM vet (Base)**Alcide UDDERgold PM vet (Base)**

Concentraat (Base) voor tepeldipoplossing voor rundvee (melkvee)

Uitsluitend voor gebruik met Alcide UDDERgold PM vet (Activator)

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN FABRIKANT

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein,
Duitsland

Distributeur:
Heemskerk België bvba
Poppel, België
T: 014 - 47 95 44
F: 014 - 47 95 45

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Alcide UDDERgold PM vet (Base)
Concentraat (Base) voor tepeldip oplossing voor rundvee (melkvee)
Uitsluitend voor gebruik met Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Werkzaam bestanddeel: Natriumchloriet

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Alcide UDDERgold PM vet (Base) is een visceuze transparante/witte oplossing met 6,4 mg/ml natriumchloriet als werkzaam bestanddeel en dinatriumedetaatdihydraat.

Bij vermenging met Alcide UDDERgold PM vet (Activator) vormt zich een gouden oplossing die nominaal 0,32% g/v natriumchloriet bevat, hetgeen resulteert in een aanvankelijke equilibriumconcentratie van 0,016% g/v chlorigzuur en een nominale waarde van 0,29% g/v natriumchloriet.

4. INDICATIES

Alcide UDDERgold PM vet is een tepeldip voor na het melken voor gebruik als hulpmiddel bij het onder controle houden van mastitis bij melkkoeien veroorzaakt door pathogenen zoals *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* of *Escherichia coli*. De gelformulering verschaft een beschermende barrière over het uiteinde van de tepel tot de volgende melkronde.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij getraumatiseerde of ontstoken tepels.

Stop met het gebruik bij koeien die tekenen van irritatie of overgevoeligheid voor het product vertonen.

Niet gebruiken voor het ontsmetten van melkapparatuur.

6. BIJWERKINGEN

Irritatie van tepels doet zich niet vaak voor; het hangt grotendeels af van de hygiëneprocedures, d.w.z. of residuen effectief worden verwijderd voorafgaand aan het melken. Wanneer de residuen van de tepeldip de kans krijgen zich op te hopen, kan zich een droge korst vormen.

Het verwijderen van een dergelijke korst kan ervoor zorgen dat de huid van de tepel pijnlijk wordt en geïrriteerd raakt.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rundvee (melkvee).

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor topicaal gebruik als een tepeldip. Doe gelijke volumes van Alcide UDDERgold PM vet Base en Activator in een schone maatcilinder of tepeldipkom en meng tot de kleur geheel uniform is. De gouden kleur in het vermengde product kan na verloop van tijd vervagen en bij hogere temperaturen kan dit sneller gebeuren. Dit is niet van invloed op de werkzaamheid van het product.

Maak de uiers en tepels vóór het melken schoon en droog. Dip alle tepels direct **na** het melken tenminste tot de helft van hun lengte in het vermengde product. Laat in de lucht drogen alvorens de koeien in de wei worden gelaten, met name bijvriesweer. Onder deze condities duurt het drogen ongeveer 8 - 20 minuten. Niet afvegen. Gemiddeld zal ongeveer 7,5 ml product per koe per melkbeurt worden gebruikt. Gebruik altijd vers vermengde Alcide UDDERgold PM vet op volle sterkte.

Was de tepels voorafgaand aan de volgende melkbeurt grondig met een compatibele uierwassing met behulp van daarvoor bestemde procedures. Raadpleeg uw veearts wanneer tekenen van ziekte aanhouden of verschijnen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Voor hergebruik dienen tepeldipkommen na elke melkronde geledigd en gewassen te worden. Wanneer het product zichtbaar vuil wordt, de inhoud weggooien en opnieuw vullen met verse oplossing. Gebruik vermengd product binnen 3 uur.

10. WACHTTERMIJN

Rundvee: Vlees – nul dagen
 Melk – nul uur

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Beschermen tegen licht. Niet in de vriezer bewaren*.

Bewaren in goed gesloten oorspronkelijke containers.

Niet in de buurt van voedsel, drank en diervoeders bewaren.

* Bevriezing zal niet van invloed zijn op de prestatie van het geleverde product op voorwaarde dat de bevroren inhoud volledig wordt ontdooid en grondig geschud **alvorens** de componenten van de Base en Activator worden vermengd.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket

Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 3 uur

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Dit diergeneesmiddel mag niet worden vermengd met andere producten.

Was de tepels voorafgaand aan het melken grondig met water of een compatibele uierwassing met behulp van daarvoor bestemde procedures en maak ze droog voorafgaand aan het melken.

Laat de koeien in vriesweer pas naar buiten nadat de dip volledig is opgedroogd. Onder deze condities duurt het drogen ongeveer 8 - 20 minuten. Raadpleeg uw veearts wanneer tekenen van ziekte aanhouden of verschijnen.

Overdosering: niet van toepassing.

Waarschuwingen voor gebruikers:

Na gebruik de handen wassen.

Gebruiken in een goed geventileerde ruimte, daar de mogelijkheid bestaat van een ophoping van irriterend chloordioxidegas.

Irriterend voor ogen. Vermijd contact met ogen; wanneer contact zich voordoet de ogen spoelen met grote hoeveelheden water. Raadpleeg een arts wanneer zich irritatie ontwikkelt.

In het geval van accidentele blootstelling verwijder door middel van verdunning, dat wil zeggen, indien uitwendig: wassen met water; indien ingenomen: drink water; en indien geïnhaleerd: breng in de frisse lucht.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Maart 2013

15. OVERIGE INFORMATIE

3,785 l (10 l, 20 l)

Exp mm/jjjj

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen: BE-V318631

Partij

Vrije aflevering

Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Concentraat (Activator) voor tepeldipoplossing voor rundvee (melkvee)
Uitsluitend voor gebruik met Alcide UDDERgold PM vet (Base)

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN FABRIKANT

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Duitsland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Concentraat (Activator) voor tepeldip oplossing voor rundvee (melkvee)
Uitsluitend voor gebruik met Alcide UDDERgold PM vet (Base)
Werkzaam bestanddeel: Melkzuur

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Alcide UDDERgold PM vet (Activator) is een visceuze gele oplossing met 26,4 mg/ml melkzuur als werkzaam bestanddeel, natriumbenzoaat (E 211) en tartrazine (E 102).

Bij vermenging met Alcide UDDERgold PM vet (Base) vormt zich een gouden oplossing die nominaal 0,32% g/v natriumchloriet bevat, hetgeen resulteert in een aanvankelijke equilibriumconcentratie van 0,016% g/v chlorigzuur en een nominale waarde van 0,29% g/v natriumchloriet.

4. INDICATIES

Alcide UDDERgold PM vet is een tepeldip voor na het melken voor gebruik als hulpmiddel bij het onder controle houden van mastitis bij melkkoeien veroorzaakt door pathogenen zoals *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* of *Escherichia coli*. De gelformulering verschaft een beschermende barrière over het uiteinde van de tepel tot de volgende melkronde.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij getraumatiseerde of ontstoken tepels.
Stop met het gebruik bij koeien die tekenen van irritatie of overgevoeligheid voor het product vertonen.
Niet gebruiken voor het ontsmetten van melkapparatuur.

6. BIJWERKINGEN

Irritatie van tepels doet zich niet vaak voor; het hangt grotendeels af van de hygiëneprocedures, d.w.z. of residuen effectief worden verwijderd voorafgaand aan het melken. Wanneer de residuen van de tepeldip de kans krijgen zich op te hopen, kan zich een

droge korst vormen. Het verwijderen van een dergelijke korst kan ervoor zorgen dat de huid van de tepel pijnlijk wordt en geïrriteerd raakt.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTWAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rundvee (melkvee)

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor topicaal gebruik als een tepeldip. Doe gelijke volumes van Alcide UDDERgold PM vet Base en Activator in een schone maatcilinder of tepeldipkom en meng tot de kleur geheel uniform is. De gouden kleur in het vermengde product kan na verloop van tijd vervagen en bij hogere temperaturen kan dit sneller gebeuren. Dit is niet van invloed op de werkzaamheid van het product.

Maak de uiers en tepels vóór het melken schoon en droog. Dip alle tepels direct **na** het melken tenminste tot de helft van hun lengte in het vermengde product. Laat in de lucht drogen alvorens de koeien in de wei worden gelaten, met name bij vriesweer. Onder deze condities duurt het drogen ongeveer 8 - 20 minuten. Niet afvegen. Gemiddeld zal ongeveer 7,5 ml product per koe per melkbeurt worden gebruikt. Gebruik altijd vers vermengde Alcide UDDERgold PM vet op volle sterkte.

Was de tepels voorafgaand aan de volgende melkbeurt grondig met een compatibele uierwassing met behulp van daarvoor bestemde procedures. Raadpleeg uw veearts wanneer tekenen van ziekte aanhouden of verschijnen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Voor hergebruik dienen tepeldipkommen na elke melkronde geledigd en gewassen te worden. Wanneer het product zichtbaar vuil wordt, de inhoud weggooien en opnieuw vullen met verse oplossing. Gebruik vermengd product binnen 3 uur.

10. WACHTTERMIJN

Rundvee: Vlees – nul dagen
Melk – nul uur

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Beschermen tegen licht. Niet in de vriezer bewaren*.
Bewaren in goed gesloten oorspronkelijke containers.
Niet in de buurt van voedsel, drank en diervoeders bewaren.

* Bevriezing zal niet van invloed zijn op de prestatie van het geleverde product op voorwaarde dat de bevroren inhoud volledig wordt ontdooid en grondig geschud **alvorens** de componenten van de Base en Activator worden vermengd.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket

Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 3 uur

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Dit diergeneesmiddel mag niet worden vermengd met andere producten.

Was de tepels voorafgaand aan het melken grondig met water of een compatibele uierwassing met behulp van daarvoor bestemde procedures en maak ze droog voorafgaand aan het melken.

Laat de koeien in vriesweer pas naar buiten nadat de dip volledig is opgedroogd. Onder deze condities duurt het drogen ongeveer 8 - 20 minuten. Raadpleeg uw veearts wanneer tekenen van ziekte aanhouden of verschijnen.

Overdosering: niet van toepassing.

Waarschuwingen voor gebruikers:

Na gebruik de handen wassen.

Gebruiken in een goed geventileerde ruimte, daar de mogelijkheid bestaat van een ophoping van irriterend chloordioxidegas.

Irriterend voor ogen. Vermijd contact met ogen; wanneer contact zich voordoet de ogen spoelen met grote hoeveelheden water. Raadpleeg een arts wanneer zich irritatie ontwikkelt. In het geval van accidentele blootstelling, verwijder door middel van verdunning, dat wil zeggen, indien uitwendig: wassen met water; indien ingenomen: drink water; en indien geïnhaleerd: breng in de frisse lucht.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Maart 2013

15. OVERIGE INFORMATIE

3,785 l (10 l, 20 l)

Exp mm/jjjj

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen: BE-V318631

Partij

Vrije aflevering