

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Rapidexon 2 mg/ml solution injectable.

[Pictogramme de la forme pharmaceutique]

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Dexaméthasone (sous forme de phosphate de sodium de dexaméthasone) 2,0 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE


25 ml

50 ml

100 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, porcins, chiens et chats.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Chevaux : voie intraveineuse, intramusculaire, intra-articulaire, intrabursale ou locale.

Bovins, porcins, chiens et chats : voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins Viande et abats : 8 jours.

Lait : 72 heures.

Porcins Viande et abats : 2 jours.

Chevaux Viande et abats : 8 jours.

Lait : Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours
Après ouverture, à utiliser avant...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas congeler.
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

[Logo de l'entreprise]

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V315533

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**{ Flacon de 100 ml }****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Rapidexon 2 mg/ml solution injectable

[Pictogramme de la forme pharmaceutique]


2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient :

Dexaméthasone (sous forme de phosphate de sodium de dexaméthasone) 2,0 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, bovins, porcins, chiens et chats.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Chevaux : voie intraveineuse, intramusculaire, intra-articulaire, intrabursale ou locale.

Bovins, porcins, chiens et chats : voie intramusculaire.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins Viande et abats : 8 jours.

Lait : 72 heures.

Porcins Viande et abats : 2 jours.

Chevaux Viande et abats : 8 jours.

Lait : Ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours

Après ouverture, à utiliser avant...

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas congeler.
Conserver le flacon dans l'emballage extérieur.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

[Logo de l'entreprise]

9. NUMÉRO DU LOT


Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

Flacon de 25 / 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Rapidexon

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

2.0 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours

Après ouverture, à utiliser avant...

[Logo de l'entreprise]