

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**Caja****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Rapidexon 2 mg/ml, solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Dexametasona (en forma de fosfato de dexametasona y sodio) 2,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE


25 ml

50 ml

100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballo, bovino, porcino, perros y gatos.

**5. INDICACIONES DE USO****6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Caballo: vía intravenosa, intramuscular, intraarticular, intrasinovial o local.

Bovino, porcino, perros y gatos: vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino Carne: 8 días
 Leche: 72 horasPorcino Carne: 2 días
Caballo Carne: 8 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C. No congelar.

Conservar el vial en el embalaje exterior.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Llea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Eurovet Animal Health B.V.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1957 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**Vial de 100 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Rapidexon 2 mg/ml, solución inyectable


2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Dexametasona (en forma de fosfato de dexametasona y sodio) 2,0 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, porcino, perros y gatos

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Caballos: vía intravenosa, intramuscular, intraarticular, intrasinovial o local.

Bovino, porcino, perros y gatos: vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino Carne: 8 días
 Leche: 72 horas

Porcino Carne: 2 días

Caballos Carne: 8 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C. No congelar.

Conservar el vial en el embalaje exterior.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Eurovet Animal Health B.V.

9. NÚMERO DE LOTE


Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Vial de 25 / 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rapidexon

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Dexametasona (en forma de fosfato de dexametasona y sodio) 2,0 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización