

ETIQUETAGE**NOTICE**

**Alcide UDDERgold PM vet (Base)
Concentré (Base) pour solution pour trempage mammaire pour vaches (laitières)
À n'utiliser qu'avec Alcide UDDERgold PM vet (Activator)**

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein,
Allemagne

Distributeur:
Heemskerk België bvba
Poppel, Belgique
T: 014 - 47 95 44
F: 014 - 47 95 45

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Alcide UDDERgold PM vet (Base)
Concentré (Base) pour solution pour trempage mammaire pour vaches (laitières).
À n'utiliser qu'avec Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Principe actif : Chlorite de sodium

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Alcide UDDERgold PM vet (Base) est une solution visqueuse transparente à blanche contenant 6,4 mg/ml de chlorite de sodium comme principe actif et de l'édétate disodique dihydraté.

Après mélange avec Alcide UDDERgold PM vet (Activator), une solution dorée se forme, ayant une valeur nominale de 0,32 % p/v de chlorite de sodium donnant une concentration initiale à l'équilibre de 0,016 % p/v d'acide chloré et une valeur nominale de 0,29 % p/v de chlorite de sodium.

4. INDICATION(S)

Alcide Uddergold PM Vet est une solution pour trempage mammaire utilisée après la traite chez la vache laitière comme aide au contrôle des mammites causées par des pathogènes tels que *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* ou *Escherichia coli*. La formulation en gel assure une barrière protectrice sur l'extrémité du trayon jusqu'à la traite suivante.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur des trayons présentant une blessure ou une inflammation.

L'application doit être suspendue sur les animaux présentant des signes d'irritation ou d'hypersensibilité au produit.

Ne pas utiliser pour la désinfection du matériel de laiterie.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas, une irritation des trayons peut survenir ; Cela dépend en général des procédures d'hygiène, c'est-à-dire si les résidus ne sont pas efficacement retirés avant la traite. Si les résidus de solution pour trempage mammaire s'accumulent, une croûte sèche peut se former. Le retrait de cette croûte peut provoquer une douleur et une irritation de la peau du trayon.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCES CIBLES

Vaches (laitières)

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Utilisation locale pour le trempage des trayons. Verser un volume égal de Alcide UDDERgold PM vet Base et d'Activator dans doseur ou un gobelet pour trempage mammaire et mélanger jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. La couleur dorée du produit mélangé peut s'éclaircir avec le temps et le phénomène peut être plus rapide à des températures élevées. Cela n'affecte pas l'efficacité du produit.

Laver et sécher les pis et les trayons avant la traite. Immédiatement **après** la traite, tremper les trayons sur la moitié de leur longueur au moins dans le produit mélangé. Laisser sécher à l'air avant de sortir les vaches dans la pâture, notamment lorsque les températures sont basses. Dans de telles conditions climatiques, le séchage prend environ 8 à 20 minutes. Ne pas essuyer. La quantité moyenne de solution qui sera utilisée par vache et par traite est d'environ 7,5 ml. Toujours utiliser un mélange fraîchement préparé du produit de trempage Alcide UDDERgold PM vet.

Avant la traite suivante, laver soigneusement les trayons avec une solution de nettoyage des pis compatible en respectant le mode d'emploi du produit. Si les signes de maladie persistent ou apparaissent, consultez votre vétérinaire.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les gobelets pour trempage mammaire doivent être vidés après chaque traite et lavés avant d'être réutilisés. Si le produit est souillé, vider le gobelet et le remplir avec une solution fraîche. Le produit mélangé doit être utilisé dans les 3 heures.

10. TEMPS D'ATTENTE

Bovins :

Viande - zéro jour

Lait - zéro heures

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Protéger de la lumière. Ne pas congeler*.

À conserver dans l'emballage d'origine soigneusement fermé.

Ne pas conserver à proximité des aliments, boissons et aliments pour animaux.

* La congélation n'affectera pas les performances du produit si les composants congelés sont décongelés complètement et agités soigneusement avant de mélanger des composants de la Base et de l'Activator.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions : 3 heures

12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Pour utilisation externe.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.

Avant la traite, laver soigneusement les trayons avec de l'eau ou avec une solution de nettoyage des pis compatible en respectant le mode d'emploi du produit et sécher les trayons.

Par basses températures, ne pas faire sortir les vaches tant que la solution pour trempage mammaire n'est pas complètement sèche. Dans ces conditions climatiques, le séchage prend environ 8 à 20 minutes. Si les signes de maladie persistent ou apparaissent, consultez votre vétérinaire.

Surdosage : Sans objet.

Mises en garde à l'attention de l'utilisateur :

Se laver les mains après utilisation.

Utiliser dans un local bien ventilé car il existe un risque d'accumulation de gaz de dioxyde de chlore irritant.

Irritant pour les yeux. Éviter tout contact avec les yeux ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas de développement d'une irritation.

En cas d'exposition accidentelle, éliminer le produit par dilution, à savoir : exposition externe : laver à l'eau ; ingestion : boire de l'eau ; inhalation : sortir à l'air frais.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Mars 2013

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

3,785 l (10 l, 20 l)

Exp. mm/aaaa

À usage vétérinaire.

Numéro d'autorisation de mise sur le marché : BE-V318631

Lot

Délivrance libre

ETIQUETAGE

NOTICE

Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Concentré (Activator) pour solution pour trempage mammaire pour vaches (laitières)
À n'utiliser qu'avec Alcide UDDERgold PM vet (Base)

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein,
Allemagne

Distributeur:
Heemskerk België bvba
Poppel, Belgique
T: 014 - 47 95 44
F: 014 - 47 95 45

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Concentré (Activator) pour solution pour trempage mammaire pour vaches (laitières).
À n'utiliser qu'avec Alcide UDDERgold PM vet (Base)
Principe actif : Acide lactique

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Alcide UDDERgold PM vet (Activator) est une solution visqueuse jaune contenant 26,4 mg/ml d'acide lactique comme principe actif, et du benzoate de sodium (E 211) et de la tartrazine (E 102).

Après mélange avec Alcide UDDERgold PM vet (Base), une solution dorée se forme, ayant une valeur nominale de 0,32 % p/v de chlorite de sodium donnant une concentration initiale à l'équilibre de 0,016 % p/v d'acide chlorure et une valeur nominale de 0,29 % p/v de chlorite de sodium.

4. INDICATION(S)

Alcide UDDERgold PM Vet est une solution pour trempage mammaire utilisée après la traite chez la vache laitière comme aide au contrôle des mammites causées par des pathogènes tels que *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* ou *Escherichia coli*. La formulation en gel constitue une barrière protectrice sur l'extrémité du trayon jusqu'à la traite suivante.

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur des trayons présentant une blessure ou une inflammation.
L'application doit être suspendue sur les animaux présentant des signes d'irritation ou d'hypersensibilité au produit.
Ne pas utiliser pour la désinfection du matériel de laiterie.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans des de rares cas, une irritation des trayons peut survenir, Cela dépend en général des procédures d'hygiène, c'est-à-dire si les résidus ne sont pas efficacement retirés avant la traite. Si les résidus de solution pour trempage mammaire s'accumulent, une croûte sèche peut se former. Le retrait de cette croûte peut provoquer une douleur et une irritation de la peau du trayon.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCES CIBLES

Vaches (laitières)

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Utilisation locale pour le trempage des trayons. Verser un volume égal de Alcide UDDERgold PM vet Base et d'Activator dans doseur ou un gobelet pour trempage mammaire et mélanger jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. La couleur dorée du produit mélangé peut s'éclaircir avec le temps et le phénomène peut être plus rapide à des températures élevées. Cela n'affecte pas l'efficacité du produit.

Laver et sécher les pis et les trayons avant la traite. Immédiatement après la traite, tremper les trayons sur la moitié de leur longueur au moins dans le produit mélangé. Laisser sécher à l'air avant de sortir les vaches dans la pâture, notamment lorsque les températures sont basses. Dans de telles conditions climatiques, le séchage prend environ 8 à 20 minutes. Ne pas essuyer. La quantité moyenne de solution qui sera utilisée par vache et par traite est d'environ 7,5 ml. Toujours utiliser un mélange fraîchement préparé du produit de trempage de Alcide UDDERgold PM vet.

Avant la traite suivante, laver soigneusement les trayons avec une solution de nettoyage des pis compatible en respectant le mode d'emploi du produit. Si les signes de maladie persistent ou apparaissent, consultez votre vétérinaire.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les gobelets pour trempage mammaire doivent être vidés après chaque traite et lavés avant d'être réutilisés. Si le produit est souillé, vider le gobelet et le remplir avec une solution fraîche. Le produit mélangé doit être utilisé dans les 3 heures.

10. TEMPS D'ATTENTE

Bovins :
Viande - zéro jour

Lait - zéro heures

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Protéger de la lumière. Ne pas congeler*.

À conserver dans l'emballage d'origine soigneusement fermé.

Ne pas conserver à proximité des aliments, boissons et aliments pour animaux.

* La congélation n'affectera pas les performances du produit si les composants congelés sont décongelés complètement et agités soigneusement avant de mélanger les composants de la Base et de l'Activator.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions : 3 heures

12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Pour utilisation externe.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.

Avant la traite, laver soigneusement les trayons avec de l'eau ou avec une solution de nettoyage des pis compatible en respectant le mode d'emploi du produit et sécher les trayons. Lorsque les températures sont basses, ne pas faire sortir les vaches tant que la solution pour trempage mammaire n'est pas complètement sèche. Dans de telles conditions climatiques, le séchage prend environ 8 à 20 minutes. Si les signes de maladie persistent ou apparaissent, consultez votre vétérinaire.

Surdosage : Sans objet.

Mises en garde à l'attention de l'utilisateur :

Se laver les mains après utilisation.

Utiliser dans un local bien ventilé car il existe un risque d'accumulation de gaz de dioxyde de chlore irritant.

Irritant pour les yeux. Éviter tout contact avec les yeux ; en cas de contact, rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas de développement d'une irritation.

En cas d'exposition accidentelle, éliminer le produit par dilution, à savoir : exposition externe : laver à l'eau ; ingestion : boire de l'eau ; inhalation : sortir à l'air frais.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

Mars 2013

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

3,785 l (10 l, 20 l)

Exp. mm/aaaa

À usage vétérinaire.

Numéro d'autorisation de mise sur le marché : BE-V318631

Lot

Délivrance libre