



## ETIQUETADO

### ALAMYCIN LA 300 oxitetraciclina

**100 ml/250ml/500ml**  
**Solución inyectable**  
**Uso veterinario**

#### **Composición**

1 ml contiene:

Oxitetraciclina (como oxitetraciclina dihidrato)	300 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

#### **Indicaciones**

Tratamiento y control de una amplia gama de infecciones comunes sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina, en bovino, ovino y porcino.

#### **Especies de destino**

Bovino, ovino y porcino

#### **Modo y vía de administración**

Vía intramuscular profunda 1 ml/10 kg p.v. (vacuno 300 kg: 30 ml, oveja 50 kg: 5 ml, cerdo 45 kg: 4,5 ml)

Instrucciones completas en el prospecto.

#### **Contraindicaciones y precauciones**

No utilizar en animales con historial de hipersensibilidad a tetraciclinas.

Una dosis doble de la terapéutica en bovino, puede originar una reacción local severa.

Mantener fuera del alcance de los niños.

#### **Tiempo de espera**

Carne: Bovino: 35 días, Porcino: 28 días, Ovino: 35 días

Leche: Bovino: 7 días, Ovino: 9 días

#### **Conservación**

En lugar fresco (por debajo de 25°C), seco y al abrigo de la luz.

Una vez que el frasco se ha perforado por primera vez, el contenido debe usarse en el plazo de 28 días.

#### **Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento no utilizado y/o los envases**

Los envases usados deberán ser eliminados de forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.



Registro nº.: 1319 ESP

Lote:

Cad:

**Titular de la autorización de comercialización**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Irlanda

**Representante local**

Laboratorios Karizoo S.A.  
P.I. La Borda, Mas Pujades 11-12  
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)  
España



## ALAMYCIN LA 300 oxitetraciclina

### Uso veterinario Solución inyectable

**CAJA : 1 frasco/12 frascos**

#### Composición

Alamycin LA 300 es una solución acuosa estéril para administración intramuscular que contiene:

Oxitetraciclina (dihidrato)	300 mg/ml
Excipientes	c.s.p.

#### Propiedades

Alamycin LA 300 está formulado específicamente para conseguir una acción prolongada, resultando en una actividad antibacteriana sostenida.

Tras la administración intramuscular de una dosis de 20 mg/kg p.v., los niveles efectivos en sangre persisten durante 3-4 días, que llegan hasta 5-6 días, si la dosis empleada es de 30 mg/kg p.v.

**Los niveles máximos en sangre se alcanzan entre las 4 y 6 horas tras la administración, lo que hace a Alamycin LA 300 apropiado para el tratamiento de infecciones agudas.**

#### Especies de destino

Bovino, ovino y porcino

#### Indicaciones

Alamycin LA 300 contiene un antibiótico de amplio espectro indicado para su uso en el tratamiento de infecciones causadas por, o asociadas con, organismos sensibles a la oxitetraciclina en bovino, ovino y porcino. Son sensibles a la oxitetraciclina una amplia gama de bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo entre otras, *Bordetella bronchiseptica*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Pasteurella* spp, *Staphylococcus* spp, y *Streptococcus* spp. Ciertos micoplasmas, rickettsias, protozoos y clamidias también son sensibles a la oxitetraciclina. Alamycin LA 300 está indicado para el control y tratamiento de una amplia gama de infecciones sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina en bovino, ovino y porcino.

Entre las indicaciones específicas se incluyen pasteurelisis, neumonía, rinitis atrófica, mal rojo, artritis, onfalitis y terapia de apoyo en mastitis.

#### Dosificación y administración

Leer las "Precauciones" antes de la administración del producto.

Dosificación: Alamycin LA 300 se administra a la dosis de 30 mg/kg p.v., para una duración de actividad prolongada, de 5 a 6 días.

Para asegurar una correcta dosificación se debe determinar el peso de los animales previo a su uso.

Dosis máxima recomendada en un sólo punto de inoculación:



Bovino:	15 ml
Ovino:	5 ml
Porcino:	10 ml
Lechones (de 1 día)	0,2 ml
(de 7 días)	0,3 ml
(de 14 días)	0,4 ml
(de 21 días)	0,5 ml
(de más de 21 días)	1 ml

Administración: Intramuscular profunda

### **Contraindicaciones**

No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.

### **Precauciones**

Precauciones generales de seguridad para el usuario:

Personas con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas deberían evitar cualquier contacto con el producto.

Precauciones generales:

No diluir Alamycin LA 300. No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas. Si se administra simultáneamente con otros tratamientos, utilizar diferentes puntos de inyección. Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

Una vez que el frasco se ha perforado por primera vez, el contenido debe usarse en el plazo de 28 días.

### **Reacciones adversas**

Ocasionalmente puede observarse una leve reacción local de naturaleza transitoria en el punto de inyección. Una doble dosis de la terapéutica en bovino, puede originar una reacción local severa.

Uso durante la gestación y la lactancia. No se recomienda el uso en hembras gestantes. El uso de tetraciclinas durante el período de desarrollo de dientes y huesos, incluyendo la última parte de la gestación, puede conducir (debido a su potente capacidad quelante del calcio) a decoloración e inhibición del crecimiento óseo..

### **Tiempo de espera**

Carne: Bovino: 35 días, Porcino: 28 días, Ovino: 35 días

Leche: Bovino: 7 días, Ovino: 9 días

### **Otras informaciones**

Una vez que el frasco ha sido perforado por primera vez, y el contenido se expone al aire, el color de la solución puede oscurecerse, sin que esto signifique pérdida de potencia.

### **Conservación**

La fecha de caducidad impresa en la etiqueta será solamente garantizada, si el producto se mantiene en el envase original sin abrir, en lugar fresco (por debajo de 25°C), seco y al abrigo de la luz.



**Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento no utilizado y/o los envases**

Los envases usados deberán ser eliminados de forma segura para el medio ambiente y de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales en la materia.

Dispensación con receta veterinaria.

Registro nº: 1319 ESP

Lote:

Cad

Fecha de apertura:

Utilizar en el plazo de 28 días después de la primera perforación.

**Titular de la autorización de comercialización**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irlanda

**Representante local:**

Laboratorios Karizoo S.A.

P.I. La Borda, Mas Pujades 11-12

08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

España