

KENNZEICHNUNG

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>
<ANGABEN AUF DEM BEÄLTNIS>

Braunglasflaschen von 50 und 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

OXYTOCINE PRODIVET 10 IE/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Oxytocinum 10.U.I – chlorobutanol hemihydricum – excip. q.s. ad 1 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 und 100 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

7. ART DER ANWENDUNG

Langsame i.v. oder i.m. Injektion

8. WARZEZET

Essbare Gewebe und Milch: 0 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich – Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Darf nicht durch schwangere oder stillende Frauen verwendet werden.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis MM/JJJJ

Nach Anbruch innerhalb von 28 Tagen verwenden und unter 25°C lagern.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern zwischen 2 – 8 °C.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN
FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS,
sofern erforderlich**

Für Tiere
Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

PRODIVET pharmaceuticals sa/nv Hagbenden 39c B - 4731 EYNATTEN.

16. ZULASSUNGSNRUMMER(N)

BE-V106881

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch-B:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
Braunglasflaschen von 10 und 20 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

OXYTOCINE PRODIVET 10 IE/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Oxytocine, 10 IE./ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10, 20 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Langsame i.v. oder i.m.

5. WARTEZEIT

Essbare Gewebe und Milch: 0 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

7. VERFALLDATUM

EXP : MM/JJJJ

Nach Anbruch innerhalb von 28 Tagen verwenden und unter 25°C lagern.

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

OXYTOCINE_ETIQ_DE_V1_20121003