

**I PIELIKUMS**  
**VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS**

## 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Advantage 40 mg šķīdums pilināšanai maza auguma kaķiem

## 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra deva (pipete 0,4 ml)satur:

### Aktīvās vielas:

Imidakloprīds (*imidaclopridum*) 40 mg

### Palīgvielas:

| Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs | Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butilēts hidroksitoluols (E 321)                    | 1 mg/ml                                                                                   |
| Benzilspirts (E 1519)                               | 832 mg/ml                                                                                 |
| Propilēnkarbonāts                                   |                                                                                           |

Dzeltens līdz gaiši brūngans šķīdums.

## 3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

### 3.1. Mērķsugas

Kaķi.

### 3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Blusu invāzijas ārstēšanai un kontrolei kaķiem.

Vienreizēja apstrāde novērš blusu invāziju uz 3 – 4 nedēļām. Šīs veterinārās zāles var lietot kā blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna daļu, ja to iepriekš ir diagnosticējis veterinārārsts.

### 3.3. Kontrindikācijas

Nelietot nenošķirti kaķēniem, kuri ir jaunāki par 8 nedēļām.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

### 3.4. Īpaši brīdinājumi

Nav.

### 3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Nepieļaut šo veterināro zāļu nokļūšanu dzīvnieka acīs vai mutē.

Nepieļaut tikko apstrādātiem dzīvniekiem laizīt vienam otru.

Pirms šo veterināro zāļu lietošanas noņemt visas kaklasiksnas. Personai, kas veic šo veterināro zāļu lietošanu, pirms kaklasiksnas uzlikšanas nepieciešams vizuāli novērtēt apstrādāto vietu, lai pārliecinātos, ka tā ir sausa.

Pareizas lietošanas vietas izvēle (uz skausta) samazina iespēju kaķim nolaizīt šīs veterinārās zāles.

Lietot tikai uz nebojātas ādas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Lietošanas laikā nepieļaut šo veterināro zāļu nokļūšanu uz ādas, acīs vai mutē.

Pēc rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm mazgāt rokas. Personas ar zināmu pastiprinātu ādas jutību var būt īpaši jutīgas pret šīm veterinārajām zālēm.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, mazgāt to ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi nejauša nokļūšana acīs, skalot tās ar lielu daudzumu ūdens.

Ja ādas vai acu kairinājums saglabājas vai notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, neēst, nedzert, nesmēķēt.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Skatīt 5.5 apakšpunktu.

Citi piesardzības pasākumi:

Šo veterināro zāļu sastāvā esošais šķīdinātājs var notraipīt dažādus materiālus, tajā skaitā, ādu, audumus, plastmasu, gatavās virsmas. Pirms saskares ar minētajiem materiāliem lietošanas vietai ļaut nožūt.

### 3.6. Blakusparādības

Kaķi

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ļoti reti<br>(<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem<br>dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi): | Uzbudinājums<br>Diareja <sup>1</sup> hipersalivācija <sup>2</sup> , vemšana <sup>1</sup><br>Neiroloģiskas pazīmes (piem. koordinācijas<br>traucējumi, trīce)<br>Ādas reakcijas (piem. apmatojuma izkrišana,<br>nieze, ādas apsārtums, ādas bojājumi)<br>Nomāktība |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Var rasties pēc norīšanas.

<sup>2</sup> Rūgtās garšas dēļ var rasties siekalošanās kaķiem, kuri laiza lietošanas vietu tūlīt pēc uzklāšanas. Tā nav intoksikācijas pazīme un izzūd dažu minūšu laikā bez ārstēšanas.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

### 3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Laboratoriskajos pētījumos žurkām un trušiņiem netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība. Nav pietiekamu pētījumu par imidakloprīda iedarbību uz grūsnām vai laktējošām kaķenēm un to pēcnācējiem. Līdzšinējie pierādījumi rāda, ka nav novērotas blakusparādības.

### 3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota nesaderība, lietojot šīs veterinārās zāles divkārsā ieteiktajā devā vienlaicīgi ar praksē bieži lietotajām veterinārajām zālēm, kas satur: lufenuronu, pirantelu un prazikvantelu, kā arī biežāk veicamajām ārstēšanas procedūrām, t.sk. vakcinācijām.

### 3.9. Lietošanas veids un devas

Uzpilināšanai.

#### Ārstēšanas shēma:

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk. Kaķiem ar ķermeņa svaru (ķ.sv.) līdz 4 kg – 1 pipete 0,4 ml

| Kaķa svars, kg | Veterinārās zāles | Pipešu skaits | Imidakloprīda deva mg/kg ķ.sv. |
|----------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| < 4 kg         | Advantage 40      | 1 x 0,4 ml    | ne mazāk kā 10                 |
| ≥ 4 kg         | Advantage 80      | 1 x 0,8 ml    | ne vairāk kā 20                |


Ja nepieciešams, ārstēšanu atkārtot ik pēc 4 nedēļām.

Atkārtota blusu invāzija var parādīties pēc 6 nedēļām vai vēlāk pēc pēdējās lietošanas, sakarā ar jaunu blusu izšķilšanos. Tādēļ, atkarībā no blusu daudzuma apkārtējā vidē, iespējams, ir nepieciešama vairāk kā viena ārstēšanas reize. Lai novērstu blusu invāziju no apkārtējās vides, ieteicams vienlaicīgi lietot līdzekli, kas iedarbojas pret blusām un to attīstības stadijām apkārtējā vidē.


Pēc apmatojuma samitrināšanas (piem., stiprs lietus, peldināšana), veterināro zāļu iedarbība turpinās, bet iespējams, ka atkarībā no blusu daudzuma apkārtējā vidē, var būt nepieciešama atkārtota lietošana. Šādā gadījumā atkārtota lietošana jāveic ne biežāk kā 1 reizi nedēļā.

#### Lietošanas veids

Izņemt vienu atbilstošas devas pipeti no iepakojuma. Turot pipeti vertikāli, pagriezt un noņemt korķīti. Korķīti pagriezt otrādi un izmantot, lai pagrieztu un atvērtu vāciņu pipetei kā parādīts attēlā.



Pašķirt apmatojumu uz dzīvnieka skausta, lai būtu redzama āda. Pipetes galu pielikt pie ādas, un pipeti vairākas reizes spēcīgi saspiest, lai visu pipetes saturu izspiestu tieši uz ādas.



### **3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)**

Lietojot pieckārtīgu ieteikto veterināro zāļu devu vienu reizi nedēļā 8 nedēļas pēc kārtas, netika novērotas klīniski izteiktas blakusparādības.

Saindēšanās pēc nejaušas, iekšķīgas uzņemšanas dzīvniekiem ir maz ticama. Nejaušas norīšanas gadījumā, nozīmēt simptomātisku ārstēšanu. Specifisku antidotu nav, bet uzlabojumu var dot aktivētās ogles lietošana.

### **3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku**

Nav piemērojami.

### **3.12. Ierobežojumu periods**

Nav piemērojams.

## **4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS**

### **4.1. ATĶvet kods: Error! Not a valid bookmark self-reference.**

### **4.2. Farmakodinamiskās īpašības**

Imidakloprīds 1-(6-hloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidīn-2-ilidenamīns ir ekto-paraziticīds, kas pieder pie hloronikotīnīla preparātu grupas. Ķīmiski to precīzāk dēvē kā hloronikotīnīla nitroguanidīnu. Imidakloprīdam ir augsta saistīšanās spēja ar blusu centrālās nervu sistēmas (CNS) post-sinaptisko apvidu nikotīnērgiskajiem acetilholīna receptoriem. Sekojošā holīnērgiskās pārraides kavēšana izraisa kukaiņa paralīzi un nāvi. Sakarā ar tā vājo iedarbību uz zīdītāju nikotīnērgiskajiem receptoriem un zemo izkļūšanas spēju caur hemoencefālajiem barjeriem, imidakloprīdam praktiski nav ietekmes uz zīdītāju CNS. Kā konstatēts zāļu drošuma pētījumos trušiem, pelēm un žurkām, tiem lietojot sub-letālas devas, imidakloprīdam ir minimāla farmakoloģiska aktivitāte. Jaunākajos pētījumos pierādīta imidakloprīda iedarbība ne tikai uz pieaugušajām blusām, bet arī tā larvacīdā iedarbība. Blusu kāpuri dzīvnieka apkārtne iet bojā pēc saskares ar apstrādātu dzīvnieku.

### **4.3. Farmakokinētiskās īpašības**

Šīs veterinārās zāles ir paredzētas arīgai lietošanai uz ādas. Pēc lokālas šo veterināro zāļu lietošanas imidakloprīds ātri absorbējas dzīvnieka ādā. Dermatoloģiskos un seruma kinētikas pētījumos ar mērķa sugu dzīvniekiem un pelēm pārdozēšanas gadījumā pierādīts, ka tā sistēmiskā absorbcija ir ļoti vāja, pārejoša un klīniski nenozīmīga. To pierāda papildu pētījumi, kuros blusas negāja bojā pēc barošanās uz iepriekš apstrādāta dzīvnieka, kuram no ādas un apmatojuma tika likvidēta visa aktīvā viela.

## **5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA**

### **5.1. Būtiska nesaderība**

Nav zināma.

### **5.2. Derīguma termiņš**

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 5 gadi.  
Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

### **5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

### **5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs**

Balta, polipropilēna, vienas devas pipete, kas noslēgta ar baltu, skrūvējamu, polipropilēna vāciņu. Vienas devas pipetes ir iepakotas polivinilhlorīda un alumīnija folijas blisteros.

Iepakojuma lielumi: Kartona kastīte, kurā ir 2, 3, 4 vai 6 vienas devas pipetes vienā vai vairākās blistera loksnēs. Katra vienas devas pipete satur 0,4 ml šķīduma.  
Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

#### **5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo imidakloprīds var būt bīstamas zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

#### **6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS**

Elanco Animal Health GmbH

#### **7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)**

V/NRP/01/1363

#### **8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS**

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 05/07/2001

#### **9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS**

06/2025

#### **10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

### **III PIELIKUMS**

#### **MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

## **A. MARKĒJUMS**



## UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

### KARTONA KASTĪTE

#### 1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Advantage 40 mg šķīdums pilināšanai

#### 2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra 0,4 ml pipete satur 40 mg imidakloprīda

#### 3. IEPAKOJUMA LIELUMS

2 pipetes

3 pipetes

4 pipetes

6 pipetes

#### 4. MĒRĶSUGAS



< 4 kg

#### 5. INDIKĀCIJAS

Blusu invāzijas ārstēšanai un kontrolei kaķiem.

Šīs veterinārās zāles var lietot kā blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna daļu.



Blusa

#### 6. LIETOŠANAS VEIDI

Uzpilināšanai

#### 7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

#### 8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

#### 9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

**10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”**

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

**11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”**

Lietošanai dzīvniekiem.

**12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS**

Elanco 

**14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI**

V/NRP/01/1363

**15. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**

**PIPETE**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Advantage 40 mg



< 4 kg

**2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI**

Imidakloprīds 40mg

0,4 ml

**3. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**4. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mm/gggg}

**UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**

**BLISTERIS**

**1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Advantage



< 4kg

**2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI**

40 mg imidaclopridum

0,4 ml

**3. SĒRIJAS NUMURS**

Lot {numurs}

**4. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mm/gggg}

## **B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### 1. Veterināro zāļu nosaukums

Advantage 40 mg šķīdums pilināšanai maza auguma kaķiem

### 2. Sastāvs

Katra deva (pipete 0,4 ml) satur:

#### Aktīvā viela:

Imidakloprīds (imidaclopridum) 40mg

#### Palīgvielas:

Butilēts hidroksitoluols (E 321) 1 mg/ml

Benzilalkohols (E 1519) 832 mg/ml

Dzeltens līdz gaiši brūngans šķīdums.

### 3. Mērķsugas

Kaķi.

### 4. Lietošanas indikācijas

Blusu invāzijas ārstēšanai un kontrolei kaķiem.

Vienreizēja apstrāde novērš blusu invāziju uz 3-4 nedēļām. Šīs veterinārās zāles var lietot kā blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna daļu, ja to iepriekš ir diagnosticējis veterinārārsts.

### 5. Kontrindikācijas

Nelietot nenošķirti kaķēniem, kuri ir jaunāki par 8 nedēļām.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret jebkuru no palīgvielām.

### 6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Nepieļaut zāļu nokļūšanu dzīvnieka acīs vai mutē.

Nepieļaut nesen apstrādātiem dzīvniekiem laizīt vienu otru.

Pirms šo zāļu lietošanas noņemt visas kaklasiksnas. Personai, kas veic šo veterināro zāļu lietošanu, pirms kaklasiksnas uzlikšanas nepieciešams vizuāli novērtēt apstrādāto vietu, lai pārliecinātos, ka tā ir sausa.

Pareizas lietošanas vietas izvērle (uz skausta) samazina iespēju kaķim nolaizīt šīs veterinārās zāles.

Lietot tikai uz nebojātas ādas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Lietošanas laikā nepieļaut šo veterināro zāļu nokļūšanu uz ādas, acīs vai mutē.

Pēc rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm mazgāt rokas.

Personas ar zināmu pastiprinātu ādas jutību var būt īpaši jutīgas pret šīm veterinārajām zālēm. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, mazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja notikusi nejauša nokļūšana acīs, skalot tās ar lielu daudzumu ūdens.

Ja ādas vai acu kairinājums saglabājas vai notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, neēst, nedzert, nesmēķēt.  
Uzglabāt atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:  
Skatīt apakšpunktu: “Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai”

#### Citi piesardzības pasākumi:

Šo veterināro zāļu sastāvā esošais šķīdinātājs var notraipīt dažādus materiālus, tajā skaitā, ādu, audumus, plastmasu, gatavās virsmas. Pirms saskares ar minētajiem materiāliem aplikācijas vietai ļaut nožūt.

#### Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Laboratoriskajos pētījumos ar žurkām un trušiem netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība.. Nav pietiekamu pētījumu par imidakloprīda iedarbību uz grūsnām vai laktējošām kaķenēm un to pēcnācējiem. Līdzšinējie pierādījumi rāda, ka nav novērotas blakusparādības.

#### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav novērota nesaderība, lietojot šīs veterinārās zāles divkārsā devā vienlaicīgi ar praksē bieži lietotajām veterinārajām zālēm, kas satur: lufenuronu, pirantelu un prazikvantelu, kā arī biežāk veicamajām ārstēšanas procedūrām, t.sk. vakcinācijām.

#### Pārdozēšana:

Lietojot piekārtīgu ieteikto veterināro zāļu devu vienu reizi nedēļā 8 nedēļas pēc kārtas, netika novērotas klīniski izteiktas blakusparādības.

Saindēšanās pēc nejaušas, iekšķīgas uzņemšanas dzīvniekiem ir maz ticama. Nejaušas norīšanas gadījumā, nozīmēt simptomātisku ārstēšanu. Specifisku antidotu nav, bet uzlabojumu var dot aktivētās ogles lietošana.

#### Būtiska nesaderība:

Nav zināma.

## **7. Blakusparādības**

Kaķi

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi): |
| Uzbudinājums                                                                            |
| Diareja <sup>1</sup> hipersalivācija <sup>2</sup> , vemšana <sup>1</sup>                |
| Neiroloģiskas pazīmes (piem. koordinācijas traucējumi, trīce)                           |
| Ādas reakcijas (piem. apmatojuma izkrišana, nieze, ādas apsārtums, ādas bojājumi)       |
| Nomāktība                                                                               |

<sup>1</sup> Var rasties pēc norīšanas.

<sup>2</sup> Rūgtās garšas dēļ var rasties siekalošanās kaķiem, kuri laiza lietošanas vietu tūlīt pēc uzklāšanas. Tā nav intoksikācijas pazīme un izzūd dažu minūšu laikā bez ārstēšanas.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām

blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: <https://www.pvd.gov.lv/lv>

## 8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Uzpilināšanai

Ārstēšanas shēma:

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Kaķiem ar ķermeņa svaru (ķ.sv) līdz 4 kg – 1 pipete 0,4 ml

| Kaķa svars, kg | Veterinārās zāles | Pipešu skaits | Imidakloprīda deva mg/kg ķ.sv. |
|----------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| < 4 kg         | Advantage 40      | 1 x 0,4 ml    | ne mazāk kā 10                 |
| ≥ 4 kg         | Advantage 80      | 1 x 0,8 ml    | ne vairāk kā 20                |

Ja nepieciešams, ārstēšanu atkārto ik pēc 4 nedēļām.

Atkārtota blusu invāzija var parādīties pēc 6 nedēļām vai vēlāk pēc pēdējās lietošanas, sakarā ar jaunu blusu izšķilšanos. Tādēļ, atkarībā no blusu daudzuma apkārtējā vidē, iespējams, ir nepieciešama vairāk kā viena ārstēšanas reize. Lai novērstu blusu invāziju no apkārtējās vides, ieteicams vienlaicīgi lietot līdzekli, kas iedarbojas pret blusām un to attīstības stadijām apkārtējā vidē.


Pēc apmatojuma samitrināšanas (piem., stiprs lietus, peldināšana), veterināro zāļu iedarbība turpinās, bet iespējams, ka atkarībā no blusu daudzuma apkārtējā vidē, var būt nepieciešama atkārtota lietošana. Šādā gadījumā atkārtota lietošana jāveic ne biežāk kā 1 reizi nedēļā.

## 9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Izņemt vienu atbilstošas devas pipeti no iepakojuma. Turot pipeti vertikāli, pagriezt un noņemt korķīti. Korķīti pagriezt otrādi un izmantot, lai pagrieztu un atvērtu vāciņu pipetei kā parādīts 1.attēlā.


Pašķirt apmatojumu uz dzīvnieka skausta, lai būtu redzama āda. Pipetes galu pielikt pie ādas, un pipeti vairākas reizes spēcīgi saspiest, lai visu pipetes saturu izspiestu tieši uz ādas, kā parādīts 2. attēlā,

Attēli parādīti instrukcijas beigās



1. attēls





2. attēls

## **10. Ierobežojumu periods**

Nav piemērojams.

## **11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

## **12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo imidakloprīds var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

## **13. Veterināro zāļu klasifikācija**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

## **14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi**

V/NRP/01/1363

Iepakojuma lielumi: Kartona kastīte, kurā ir 2, 3, 4 vai 6 vienas devas pipetes vienā vai vairākās blistera loksnes. Katra vienas devas pipete satur 0,4 ml šķīduma.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

**15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta**

06/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Kontaktinformācija:**

Tirdzniecības atļaujas turētājs un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Vācija

Tel: +372 8840390

PV.LVA@elancoah.com

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel

Vācija