

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Nafpenzal DC maść dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda 3 g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:

Substancje czynne:

Benzylopenicylina prokainowa	300 mg
Nafcylina (w postaci nafcyliny sodowej)	100 mg
Dihydrostreptomycyna (w postaci dihydrostreptomycyny siarczanu)	100 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

4 tubostrzykawki dowymieniowe + 4 chusteczki

20 tubostrzykawk dowymieniowych + 20 chusteczek

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT


Bydło (krowy w okresie zasuszenia).

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Dowymieniowo.

Zawartość jednej tubostrzykawki dowymieniowej należy delikatnie wprowadzić do strzyku każdej części gruczołu mlekowego jednokrotnie w okresie zasuszenia. Stosować wyłącznie dowymieniowo. Przed wprowadzeniem weterynaryjnego produktu leczniczego należy dokładnie zdoić gruczoł mlekowy. Strzyk i okolice jego ujścia należy odpowiednio wyczyścić i zdezynfekować przy użyciu załączonej chusteczki (A). Należy nie dopuścić do zanieczyszczenia konusa tubostrzykawki dowymieniowej. Odłamać koniec nasadki i wprowadzić ostrożnie 5 mm końcówki tubostrzykawki dowymieniowej (B) lub usunąć całą nasadkę i wprowadzić ostrożnie całą końcówkę tubostrzykawki dowymieniowej (C) do kanału strzykowego. Weterynaryjny produkt leczniczy należy rozprowadzić delikatnie masując strzyk i wymię. Tubostrzykawka dowymieniowa przeznaczona jest wyłącznie do jednokrotnego zastosowania.



7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 14 dni.

Mleko: 36 godzin od wycielenia przy okresie zasuszenia co najmniej 42 dni.

Jeśli okres zasuszenia był krótszy niż 42 dni, przed przeznaczeniem do spożycia mleko należy poddać badaniu na obecność antybiotyków.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Intervet International B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia: 688/99

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Tubostrzykawka dowymieniowa LDPE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Nafpenzal DC

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tubostrzykawka dowymieniowa 3 g zawiera: benzylopenicylina prokainowa 300 mg, nafcylina sodowa 100 mg, dihydrostreptomycyny siarczan 100 mg.

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.