

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
és címke 50 g és 1000 g granulátumot tartalmazó tasaknak

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Dr. Varga József (7100 Szekszárd, Rozsnyai Mátyás utca 15.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Primavet Produkt Kft. (1108 Budapest, Gumigyár u. 5-7.)

Forgalmazó:

Tolnagor Kft. (7100, Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

SH-Fenbendazol 5% granulátum A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Fenbendazol 5.0 g

Burgonyakeményítő, laktóz-monohidrát, koloid vízmentes szilícium-dioxid, povidon ad 100,0g

4. JAVALLAT(OK)

A fenbendazol széles spektrumú antiparazitikum, amely sertés, szarvasmarha, juh, számos fonalférge ellen hatásos, gyomor bélférgek, tüdőférgek, mind az ivarérett mind a fejlődési stádiumok ellen, valamint több galandfereg faj ellen is hatékonyan alkalmazható. Ovicid hatású a fonalféregpetékre.

Sertés: *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum* spp., *Metastrongylus apri*

Szarvasmarha: *Haemonchus*, *Ostertagia* (nyugvó lárvái ellen is), *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Bunostomum*, *Trichuris*, *Strongyloides* és *Oesophagostomum* fajok, *Dictyocaulus* fajok, Galandférgek: *Moniezia* fajok.

Juh: *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Bunostomum*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Chabertia* fajok, valamint *Trichuris* fajok, *Dictyocaulus filaria*, Galandférgek: *Moniezia* fajok.

A fenbendazol *Trichuris* fajok elleni hatékonysága változó.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a hatóanyagokkal, vagy bármely segédanyaggal, vivőanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismeretesek. Ha nem kívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés, szarvasmarha, juh

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Az egyszeri kezelés adagja:

Célállatfaj	Fenbendazol adagolása	5% granulátum adagolása
Szarvasmarha	7.5 mg/ttkg	1,5 g/ 10 ttkg
Juh	5.0 mg/ttkg	1,0 g/ 10 ttkg
Sertés	5.0 mg/ttkg	1,0 g/ 10 ttkg

Szájon át, az állatok egyedi takarmányába keverve, egyedi ill. csoportos kezelésre alkalmazandó.

Szarvasmarha:

7,5 mg/ttkg fenbendazol (megfelel 1,5 g SH-Fenbendazol 5 % gran./10 ttkg) egyszeri alkalommal. A kezelést 3-4 havonta célszerű megismételni.

Juh:

5 mg/ttkg fenbendazol (megfelel 1 g SH-Fenbendazol 5 % gran./10 ttkg) egyszeri alkalommal.

A kezelést 3-4 havonta célszerű megismételni.

Sertés:

5 mg/ttkg fenbendazol (megfelel 1 g SH-Fenbendazol 5 % gran./10 ttkg) egyszeri alkalommal, vagy osztott dózissal 5 napon keresztül kezelünk.

Metastrongylus apri és/vagy *Trichuris suis* fertőzöttség hatékony kezelésére az osztott dózissal végzett 7 napos kezelés ajánlott.

A kezelést 3 havonta célszerű megismételni.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Kocák és kanok: A kocákat a vemhes koca szállásra telepítés előtt, majd az elválasztás után ismételt kezeljük. A kanokat 6 hónaponként kell kezelni.

Növendék és hízóállomány: A választott malacokat megvásárláskor, vagy a hízlaldába telepítéskor kell kezelni. A kezeléshez szükséges SH-Fenbendazol 5% granulátum 100 kg takarmányba keverendő mennyiségének kiszámítási módja sertések részére:

1 napos kezelés (adag: 1 g készítmény /10 ttkg)

(átlag testsúly (kg) X állatok száma)

----- = Készítmény kg /100kg táp
(átlagos napi tak. fogyasztásX állatok darab száma) X 100

5 napos kezelés (adag: 0.2 g készítmény /10 ttkg 5 napig)

átlag testsúly (kg) X állatok száma

----- = Készítmény kg /100kg táp
(átlagos napi tak. fogyasztás X állatok darab száma) X 500

7 napos kezelés (adag: 0.143 g készítmény /10ttkg 7 napig)

átlag testsúly (kg) X állatok száma

----- = Készítmény kg /100kg táp
(átlagos napi tak. fogyasztásX állatok darab száma) X 700

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap

Szarvasmarha hús és egyéb ehető szövetek: 8 nap

Tehéntej: 5 nap

Juh hús és egyéb ehető szövetek: 8 nap

A készítménnyel emberi fogyasztásra szánt tejet termelő juhok nem kezelhetők.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25° C-on tárolandó.

A felhasználható a csomagoláson feltüntetett gyártási időtől számított 3 évig.

A csomagolás felbontás után 1 hónapig felhasználható.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A granulátum bekeverése során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruházat, védőszemüveg, porálarc, gumikesztyű. A munka befejezése után alapos kézmosás kötelező. Kerüljük el, hogy a készítmény a bőrre jusson.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges gyógyszereket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2021. november 30.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség:

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Forgalmazhatóság:

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Kiszerelési egységek:

50 g és 1000 g triplex zacskóban.

Törzskönyvi szám:

3039/1/11 MgSzH ÁTI (50 g)

3039/2/11 MgSzH ÁTI (1000 g)

Gyártási szám:

EXP: