

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 AMER (Girona) Spain.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S lyof. ad us.vet.
Živá lyofilizovaná vakcína obsahující lentogenní kmen La Sota.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení jedné dávky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota $10^{6,5} - 10^{8,5}$ EID₅₀

Lyofilizační medium:

Kalium chloridum, Dinatrii phospas dodecahydricus, Kalii dihydrogeno phospas, Povidonum 30, Gelatina, Natrii chloridum, Saccharum, Mononatrii glutamatum, Agua ad injectabilia.

Zřed'ovač pro okulární, nazální a sprejovou aplikaci:

Agua ad injectabilia q.s.ad 0,03 ml.

4. INDIKACE

Ochranná vakcinace kura domácího proti newcastleské chorobě.

5. KONTRAINDIKACE

Bez kontraindikací.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V době od 5. – 7. dne po vakcinaci se mohou projevit mírné dýchací potíže.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí od stáří 7 dnů.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTU A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob použití:

Perorání, okulonazální a sprejový.

Vakcinační program stanovený vet.lékařem vychází ze zdravotní kondice ptáků dané farmy a oblasti.

Doporučený vakcinační program: Dávka na kus všem věkovým kategoriím cílových zvířat.

Aplikace okulonazální:

Lyofilizovaná složka vakcíny se rozpustí v přiloženém zřed'ovači a aplikuje v dávce jedné kapky vhodným kapátkem do nostrily nebo oka ptáka.

Orální aplikace:

Rozpusťte lyofilizát vakcíny do poloviny lékovky v pitné vodě. Protřepte a takto naředěný roztok vlijte do čerstvé pitné vody v množství, které bude ptáky vypito během ½ až 1 hodiny.

Věk ptáků

Množství vody na 1000 ptáků

1 až 3 týdny

5 – 10 litrů

4 až 9 týdnů

12 – 23 litrů

10 až 16 týdnů

27 – 37 litrů

Sprejová vakcinace:

Použijte odpovídající ředění vakcíny podle předpokladu vakcinace.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Nenapájet kuřata ½ až 1 hodinu před vakcinací z důvodu plného využití léčebné dávky vakcíny při perorálním podání.

V případě, že počet pro vakcinaci nařazených lékůvek neodpovídá počtu kusů určených k vakcinaci, je předávkování možné.

Při sprejové aplikaci vakcíny používat ochrannou masku a brýle.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Skladovat při teplotě +2 až +8 °C, v temnu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Skladovat mimo dosah dětí.

Při nekorektní aplikaci vakcíny vet.lékařem vyhledat lékařské ošetření.

Spotřebovat do 1 hodiny po nařazení.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

říjen 2007

15. DALŠÍ INFORMACE

Balení: 10 x 1000 dávek, 10 x 2500 dávek, 10 x 5000 dávek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.