

**NOTICE**

Poulvac P Canary

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour canaris et pinsons

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

**Zoetis Belgium SA**

Rue Laid Burniat 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

Fabricant responsable de la libération des lots:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodon s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya (Girona)

Espagne

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Poulvac P Canary

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable pour canaris et pinsons.

**3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)**

Par dose:

**Substance active :**

Canary Pox Virus, souche KP1  $\geq 10^{4,0}$  EID<sub>50</sub>\*

\* Egg Infective Dosis

**4. INDICATION(S)**

Pour l'immunisation active des canaris et pinsons (indigènes) sains contre la variole du canari (maladie des bâillements ou bâille-bec).

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez des animaux malades.

**6. EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

**7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Canaris et pinsons.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Le vaccin doit être administré selon la méthode wing-web.

De la mi-juin à la mi-juillet, vaccinez tous les canaris présents une seule fois. Plus tard, les jeunes devront être vaccinés séparément à partir de l'âge de 4 semaines. Evitez autant que faire se peut tout stress avant et après la vaccination. La méthode de vaccination doit être appliquée avec beaucoup de précaution pour que la vaccination soit réussie.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

### *Administration du vaccin :*

Ouvrez les deux flacons et aspirez le liquide dans la seringue fournie ; transférez le liquide dans le flacon de vaccin lyophilisé. Pour obtenir une bonne dilution, remplissez et videz la seringue plusieurs fois, mais en évitant toute formation de mousse.

### *Avant la vaccination :*

Passez d'abord la double aiguille à la flamme d'alcool à brûler afin de la dégraisser.

Les aiguilles ne peuvent pas devenir bleues ou rougeoyer. Refroidissez-les ensuite dans de l'eau bouillie froide et secouez-les. Les canaux des deux aiguilles doivent être vides à présent.

Trempez les deux aiguilles dans la solution de vaccin ; raclez-les ensuite contre le goulot du flacon pour éliminer le produit excédentaire.

Cette procédure doit être répétée pour chaque oiseau !

### *La vaccination :*

Tenez l'oiseau et étendez l'une de ses ailes avec la partie inférieure vers le haut.

Soufflez sur les plumes pour les écarter et piquez les deux aiguilles dans la membrane alaire.

Ne touchez pas aux plumes, aux muscles ou aux articulations.

7 jours après la vaccination, une pustule apparaît à l'endroit de la vaccination. Une semaine plus tard, l'oiseau est protégé pour toute une année.

Après la vaccination, vous devez jeter les résidus de vaccin, le flacon et les aiguilles, après les avoir désinfectés à l'eau bouillante. Lavez-vous et désinfectez-vous les mains. Un flacon de vaccin brisé ne peut jamais être utilisé pour les oiseaux d'un autre éleveur, au risque de transmettre le virus sauvage.

### *Vaccination d'urgence :*

Lorsque la maladie se déclare dans un élevage non vacciné, les oiseaux ayant l'air en bonne santé peuvent encore être vaccinés. La vaccination sera toutefois trop tardive pour les oiseaux déjà contaminés mais qui n'en présentent pas encore les symptômes.

Vaccinez chaque oiseau tous les ans, au moment où les plus jeunes sont âgés de 4 semaines, mais au plus tard à la mi-juillet.

Après la 1<sup>ère</sup> vaccination, les jeunes oiseaux développent à l'endroit de l'administration un petit nodule de la taille d'un grain de riz, ce qui prouve que la vaccination est réussie. Le développement de ce bouton doit donc être contrôlé. S'il ne se développe pas chez les jeunes oiseaux, séparez-les et vaccinez-les à nouveau.

Lors des nouvelles vaccinations, le nodule est beaucoup plus petit.

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Protéger de la lumière.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après EXP.

Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions : 2 heures.

**12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Les oiseaux non vaccinés ne peuvent jamais être installés près des oiseaux vaccinés, et inversement. Les oiseaux vaccinés peuvent en effet être porteurs de virus virulents très fréquents dans la nature, sans manifester des symptômes de maladie.

Chaque population peut comporter des animaux qui ne développent pas de réponse immunologique, ou alors limitée, à la vaccination.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Ne pas mettre de bain à disposition de l'oiseau la première semaine suivant la vaccination.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Le nodule sera plus grand.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

Juillet 2017

**15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Présentation : Flacon à 50 doses en verre type I fermé avec un bouchon en caoutchouc (chlorobutyl) incl. seringue, aiguille et solvant.

Sur prescription vétérinaire

BE-V127023