

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

za 10 ml / 20 ml / 50 ml / 100 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Hypophysin LA 35 µg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče
karbetocin

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

Učinkovina:

karbetocin 35,00 µg

Pomožne snovi:

klorokrezol 1,00 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Za intramuskularno ali intravensko uporabo. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo, prašiči

Meso in organi:

Nič dni.

Govedo

Mleko:

Nič ur.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nosečnice in doječe ženske se morajo izogibati ravnanju z zdravilom.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do:

Rok uporabnosti po prvem načetju vial: 28 dni

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 - 8 °C). Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Nemčija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0170/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**20 ml / 50 ml / 100 ml viala****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Hypophysin LA 35 µg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče
karbetocin

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje:

Učinkovina:

karbetocin 35,00 µg

Pomožne snovi:

klorokrezol 1,00 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA**4. VELIKOST PAKIRANJA**

20 ml

50 ml

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Za intramuskularno ali intravensko uporabo. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo, prašiči Meso in organi: Nič dni.

Govedo Mleko: Nič ur.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do:

Rok uporabnosti po prvem načetju vial: 28 dni

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 - 8 °C). Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Nemčija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0170/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

10 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Hypophysin LA 35 µg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče
karbetocin

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

35 µg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za intramuskularno ali intravensko uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo, prašiči

Meso in organi:

Nič dni.

Govedo

Mleko:

Nič ur.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do:

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.