

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de plástico de 2, 10 o 20 viales de 1 dosis (2 ml)  
Caja de cartón de 1 vial de 5 dosis (10 ml)  
Caja de plástico de 5 o 10 viales de 5 dosis (10 ml)  
Caja de cartón de 1, 12 o 24 viales de 25 dosis (50 ml)  
Caja de cartón de 1 vial de 50 dosis (100 ml)

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Fencovis suspensión inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

<i>Escherichia coli</i> , cepa O8:K35 (adhesina fimbrial F5), Inactivada	PR* ≥1
Rotavirus bovino, serotipo G6P1, cepa TM-91, Inactivado	PR* ≥1
Coronavirus bovino, cepa C-197, Inactivado	PR* ≥1

\*Potencia relativa

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

2 x 1 dosis (2 ml)  
10 x 1 dosis (2 ml)  
20 x 1 dosis (2 ml)  
1 x 5 dosis (10 ml)  
1 x 25 dosis (50 ml)  
1 x 50 dosis (100 ml)  
5 x 5 dosis (10 ml)  
10 x 5 dosis (10 ml)  
12 x 25 dosis (50 ml)  
24 x 25 dosis (50 ml)

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (novillas y vacas gestantes).

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: cero días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

Una vez abiertos, los viales no deben conservarse a más de 25 °C.

No congelar.

Proteger de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Llea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

4097 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****Vial de vidrio o de plástico de 100 ml (50 dosis)****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Fencovis suspensión inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada dosis (2 ml) contiene:

*Escherichia coli*, cepa O8:K35 (adhesina fimbrial F5), Inactivada PR\* ≥1

Rotavirus bovino, serotipo G6P1, cepa TM-91, Inactivado PR\* ≥1

Coronavirus bovino, cepa C-197, Inactivado PR\* ≥1

\*Potencia relativa

50 dosis (100 ml)

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino (novillas y vacas gestantes).

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN****i.m.**

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera: cero días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO****Vial de vidrio de 1 dosis (2 ml)****Viales de vidrio o de plástico de 5 dosis (10 ml) y 25 dosis (50 ml)****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Fencovis

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

1 d.

5 d.

25 d.

2 ml

10 ml

50 ml

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.