KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton für 50/100/250 ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advocin 180, 180 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)Danofloxacinum 180 mg/ml
(Äquivalent 228.4 mg/ml danofloxacini mesilas)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml, 100 ml, 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

SK – IV

7. WARTEZEITEN**Wartezeit:**

Essbare Gewebe: 8 Tage

Milch: 4 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

In der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V232346

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett Durchstechflasche (100/250 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advocin 180, 180 mg/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Danofloxacinum 180 mg/ml
(Äquivalent 228.4 mg/ml danofloxacini mesilas)

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder

4. ARTEN DER ANWENDUNG

SK – IV
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN**Wartezeit:**

Essbare Gewebe: 8 Tage

Milch: 4 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.
In der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett Durchstechflasche (50 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Advocin 180

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Danofloxacinum 180 mg/ml
(Äquivalent 228.4 mg/ml danofloxacini mesilas)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen verwendbar bis