

**NOTICE**

Imaverol 100 mg/ml, Solution à diluer pour solution cutanée

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

AUDEVARD  
42-46 rue Médéric,  
92110 Clichy (France)

Fabricant responsable de la libération des lots:

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica S.A.  
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B  
Queluz de Baixo  
2730-055 Barcarena  
Portugal

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Imaverol 100 mg/ml, Solution à diluer pour solution cutanée  
Énilconazole.

**3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS**

Par ml :

**Principe actif:**  
Énilconazole 100 mg

**Excipients :**

Monolaurate de sorbitane  
Polysorbate

**4. INDICATIONS**

Le médicament vétérinaire est indiqué dans le traitement des dermatophytoses chez les bovins, les chevaux et les chiens lorsqu'elles sont provoquées par:

*Trichophyton verrucosum*  
*Trichophyton mentagrophytes*  
*Trichophyton equinum*  
*Microsporum canis*  
*Microsporum gypseum*

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Aucune.

## 6. EFFETS INDÉSIRABLES

Le médicament vétérinaire est très bien toléré. Contrairement à la solution concentrée, la solution diluée n'irrite ni la peau ni les yeux, et peut être léchée par les animaux traités sans risque d'effets secondaires. Le médicament vétérinaire n'est pas corrosif.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

## 7. ESPÈCES CIBLES

Bovins, chevaux et chiens.

## 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION

Pour usage topique exclusivement.

À diluer et à administrer dans un local bien ventilé

Il faut diluer la solution concentrée d'Imaverol dans 50 parts d'eau tiède pour obtenir une solution à 0,2% (2000 ppm): 1 part de solution concentrée dans 50 parts d'eau : par exemple 100 ml d'Imaverol dans 5 litres d'eau tiède.

Le traitement consiste en 4 applications locales avec un intervalle de 3 à 4 jours entre chaque application. Dans les cas difficiles, la durée du traitement doit être prolongée.

Les dermatophytes se développent jusque dans les follicules pileux. Il est donc nécessaire d'éliminer d'abord les croûtes éventuelles à l'aide d'une brosse dure, imbibée de la solution diluée d'Imaverol. Il est vivement conseillé de badigeonner entièrement l'animal avec la solution lors du premier traitement pour atteindre également les lésions subcliniques.

Si plusieurs lésions sont présentes, il est préférable de couper ou, dans le cas des chiens, de raser précautionneusement tous les poils.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

**Bovins:** On pourra soit laver les animaux avec la solution diluée, soit appliquer la solution avec un pulvérisateur ou une lance à haute pression. Chez les bovins adultes, il faut utiliser au moins 1 litre de la solution diluée à chaque application, et chez les veaux au moins ½ litre.

**Chiens:** Il faut faire pénétrer la solution diluée en frictionnant bien le pelage à rebrousse-poil afin d'assurer une bonne humidification de la peau. Dans ce but, il est même conseillé de tondre les chiens à poils longs avant le traitement. Les chiens peuvent même être baignés dans la solution diluée.

**Chevaux:** Lors de la première application, l'animal doit être entièrement lavé avec la solution. Lors des administrations suivantes, on appliquera en frictionnant la solution diluée sur les lésions et la peau entourant les lésions.

## 10. TEMPS D'ATTENTE

Bovins: Viande et abats – zéro jour  
Lait – zéro jour

Chevaux: Viande et abats – zéro jour

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

A conserver le flacon dans l'emballage d'origine.

A conserver dans un local bien ventilé.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur le flacon après EXP.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 3 mois.

Durée de conservation après dilution : à utiliser immédiatement.

## 12. MISE EN GARDE PARTICULIÈRE

### Précautions particulières d'emploi

Les dermatophytes, tout particulièrement *Trichophyton verrucosum*, *T. mentagrophytes* et *Micosproum canis* ont un potentiel zoonotique. Il importe par conséquent de prendre des mesures de précaution (porter des gants de protection, ne pas entrer en contact avec les poils) lors du traitement des animaux.

### Précautions particulières d'emploi chez l'animal

La solution doit être diluée avant l'emploi. Pour usage externe exclusivement.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux

Porter des vêtements protecteurs tels que des gants étanches en caoutchouc et des lunettes de sécurité.

Si le concentré entre en contact avec la peau, ôter immédiatement le vêtement souillé et laver abondamment la peau à l'eau et au savon.

Si le concentré entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau.

Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion accidentelle, rincer immédiatement la bouche avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.

Se laver les mains après usage.

### Utilisation en cas de gestation ou de lactation

Le médicament vétérinaire peut être utilisé en toute sécurité en cas de gestation et en période de lactation.

### Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

L'application locale d'une quantité excessive de solution diluée n'entraînera aucun effet toxique. Même en cas de prise orale de la solution diluée, l'absorption systémique est tellement réduite qu'il ne faut craindre aucun symptôme toxique. En cas d'ingestion accidentelle du produit non dilué, des effets nerveux centraux atypiques peuvent se produire.

## 13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Le produit ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques.

## 14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Mars 2019

## **15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Flacon en polyéthylène (1000 ml) fermé par un bouchon à visser en polypropylène.

**CANALISATION** : Sur prescription vétérinaire.

BE-V319374