

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/97/0575

Calciject PMD šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Ziemeļīrija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calciject PMD šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāts	166,0 mg
Borskābe	34,0 mg
Dekstrozes monohidrāts	200,0 mg
Magnija hipofosfīts (kā heksahidrāts)	50,0 mg

Palīgviela(s):

Hlorkrezols (kā konservants)	1, 0 mg
------------------------------	---------

Caurspīdīgs, dzeltens, sterils ūdens šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Calciject PMD ir indicēts hipokalcēmijas ārstēšanai, kura complicēta ar fosfora un magnija trūkumu, un kuru pavada hipoglikēmija liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām un kazām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Neievadīt intramuskulāri.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas un kazas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Subkutānai vai lēnai intravenozai lietošanai.

Liellopiem: 200 – 400 ml;

Zirgiem: 150 – 300 ml;

Cūkām, aitām un kazām: 15 – 50 ml.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas sasildīt šķīdumu līdz ķermeņa temperatūrai. Intravenozā injekcija jāveic lēni. Ievērot vispārpieņemtos aseptikas pasākumus.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Ātra intravenoza injekcija var izraisīt sirds aritmiju un smagāk toksēmiskiem dzīvniekiem kolapsu un nāvi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Piena trieku izraisa akūta kalcija līmeņa samazināšanās asinīs. Pēcdzemdību periodā var parādīties arī hipofosfatēmija un hipomagnēzija. Calciject PMD, ievadīts ar subkutānu injekciju, atjauno kalcija, fosfora un magnija jonu koncentrāciju plazmā. Dekstroze ir iekļauta kā enerģijas avots, lai atbilstu augstajam enerģijas patēriņam atnešanās laikā.