

Šīm veterinārām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz iepakojuma markējuma

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Kenocidin Spray and Dip 5 mg/ml, šķīdums tesmens pupu iemērkšanai/ aerosols tesmens pupu apstrādei slaucamām govīm
Chlorhexidine dicluconate

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Hlorheksidīna diglukonāts: 5.00 mg/ml (līdzvērtīgs hlorheksidīnam 2,815 mg/ml)

Briljantzilais 85% (E133): 0.035 mg/ml

Glicerīns: 60.00 mg/ml

Alantoīns: 1.00 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Lietošanai uz tesmeņa.

Zils, viskozs šķidrums.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Ne visi iepakojumu izmēri var tikt izplatīti.

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (slaucamām govīm)

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pupu dezinfekcijai, kas ietilpst mastīta profilakses plānā slaucamām govīm.

Pupu ādas un pupu galu kopšanai.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Veterinārās zāles ir gatavas lietošanai pēc slaukšanas, un tas jālieto līdz divām reizēm dienā.

Katrai govij izlietojiet vismaz 5 ml vienā reizē.

Iemērciet katras govs pupus nekavējoties pēc slaukšanas. Noteikti iemērciet trīs ceturtdaļas pupa.

Kad nepieciešams, iemērkšanas trauks vai pulverizators jāpiepilda no jauna.

Ja izmantojat parasto iemērkšanas trauku vai pulverizatoru, katrā slaukšanas reizē jālieto svaigs šķīdums. Iemērkšanas trauks vai pulverizators jāiztukšo, jāiztūra un jāizskalo pēc katras slaukšanas reizes vai slaukšanas laikā, kad tiek piesārņots. Nepārlejiet atlikušo šķīdumu no iemērkšanas trauka vai pulverizatora atpakaļ oriģinālajā tvertnē. Nelietojet veterinārās zāles slaukšanas aprīkojuma tīrīšanai un/vai sterilizēšanai.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļa un blakuproduktiem: nulle dienas.

Piens: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nodrošināt pupu un tesmens tīribu un sausumu pirms nākamās slaukšanas.

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Hlorheksidīnu var inaktivēt, lietojot anjonu un bezjonu virsmasaktīvās vielas (piemēram, ziepes, tajā skaitā dabiskās) vai neorganiskos anjonus, tāpēc nejaukt ar krāna ūdeni, citām ķīmiskām vielām, dezinfekcijas līdzekļiem un citiem produktiem, kas paredzēti pupu un tesmeņa kopšanai.

Šīs veterinārās zāles paredzētas tesmeņa kopšanai, un ievērojama uzsūkšanās nenotiek.

- Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem**

Ja parādās slimības pazīmes, konsultēties ar veterinārārstu.

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms pakļaujat govis mitriem (lietainiem), aukstiem vai vējainiem apstākļiem, ļaujiet veterinārajām zālēm nožūt.

Ja temperatūra ir zemāka par sasalšanas temperatūru, pirms liellopu laišanas ārā pupiem ļaut nožūt.

Lietojot pupiem, kam ir ādas ievainojumi, var tikt kavēta brūču dzīšana. Ieteicams pārtraukt lietošanu līdz sadzīst ievainojumi. Organisko vielu (strutu, asins utt.) klatbūtnē var mazināt dezinficejošā hlorheksidīna iedarbību.

- Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai**

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja tās iekļūst acī, izskalojiet acis ar tīru, tekošu ūdeni un vērsieties pēc ārsta padoma.

Nejaušas norīšanas gadījumā iedzeriet lielu daudzumu ūdens un nekavējoties vērsieties pēc ārsta palīdzības.

Uzglabāt atsevišķi no cilvēku uztura un dzīvnieku barības.

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.

Ja produkts tiek izmantots kā aerosols, novērst strādāšanu piesmidzinātajā gaisā .

Personām, kam ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

- Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)**

Mainot pupu iemērcamā šķīduma aktīvās sastāvdaļas, retos gadījumos var izraisīt ādas kairinājumu.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas šajā markējumā nav minētas, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

- Kontrindikācijas**

Nelietojiet, ja ir paaugstināts jutīgums pret hlorheksidīnu vai citām palīgvielām

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Izmešanas datums: ____ / ____ / ____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā

Sargāt no sasalšanas.

Ja veterinārās zāles ir sasalušas, atkausēt siltā vietā un pirms lietošanas labi sakratīt.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Produkts nedrīkst ieklūt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdens organismus.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNiem NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese, un ražošanas atļaujas turētājs, kas atbild par sērijas izlaidi:

CIDLINES NV
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
Belgija
Tāl. +32 (0) 57 21 78 77
Fakss. +32 (0) 57 21 78 79
e-pasts: info@cidlines.com

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/12/0019

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot