

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Coli-4800 WS 4 800 000 TV/g, milteliai geriamajam tirpalui ruošti veršeliams, paukščiams ir kiaulėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 g miltelių yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

kolistino sulfato 4 800 000 TV;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

silicio dioksido, laktozės
monohidrato.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Balti milteliai.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Veršeliai, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Veršeliams, kiaulėms ir paukščiams (vištoms, kalakutams), sergantiems virškinimo trakto infekcinėmis ligomis, kurias sukelia kolistinui jautrios bakterijos *E. coli*, *Haemophilus* ir *Salmonella* spp., gydyti.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumu kolistinui.

Negalima naudoti gyvūnams, kuriems stipriai sutrikusi inkstų funkcija.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Negalima naudoti gyvūnams su aktyviu mikrobiniu virškinimu.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti mažesnėmis nei terapinės dozės. Taip pat žr. p. 4.3.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas kolistinui, turi vengti naudoti šį veterinarinį vaistą. Veterinarinį vaistą reikia naudoti apdairiai, taikant visas apsaugos priemones. Atsitiktinai patekus ant odos, tą vietą nuplauti dideliu kiekiu vandens. Atsitiktinai prarijus ar patekus į akis reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Veido, lūpų ar akių tynis ar kvėpavimo sutrikimai yra sunkūs simptomai ir tuo atveju reikalinga skubi medicinos pagalba.

Naudojus vaistą, reikia nusiplauti rankas. Vaistą naudoti apdairiai.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Gali pasireikšti inkstų funkcijos sutrikimas, neurotoksinis poveikis ir nervų-raumenų blokada.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kolistinas veikia sinergiškai su daugeliu antimikrobinių medžiagų, tokių kaip beta-laktaminės medžiagos, eritromicinas, tetraciklinai, sulfonamidai, trimetoprimas ir bacitracinas. Jo veikimą slopiną dvivalenčiai katijonai, kaip Ba^{2+} , Ca^{2+} ir Mg^{2+} , nesočios riebiosios rūgštys ir ketvirtiniai amonio dariniai.

Negalima maišyti su jokia kitu veterinariniu vaistu.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Sugirdyti su geriamu vandeniu.

Veršeliams: du kartus per parą girdyti 1 g/80 kg kūno svorio, gydyti 5 – 7 dienas.

Kiaulėms: 1 kg miltelių 4000 – 8000 l geriamo vandens gydyti 5 – 7 dienas. Su geriamu vandeniu reikia sugirdyti 4 200 000 – 8 400 000 TV kolistino sulfato/kiaulei/per parą arba skaičiuoti, kad 70 kg kiaulė gautų 60 000 – 120 000 TV kolistino sulfato/kg kūno svorio (vidutiniškai kiaulė per parą išgeria 7 l vandens).

Paukščiams: 1 kg miltelių 4000 – 8000 l geriamo vandens, gydyti 3 – 5 dienas. Taip pat galima skaičiuoti, kad 100 paukščių išgeria 7 l vandens, taigi vienas paukštis turėtų gauti 42 000 – 84 000 TV kolistino sulfato per parą.

Atsižvelgiant į naudotiną dozę, gydomų gyvūnų skaičių ir svorį, tikslus veterinarinio vaisto dienos kiekis gali būti apskaičiuotas naudojant žemiau pateiktą formulę. Vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje:

$$\frac{\text{..... mg vaisto/ kg kūno svorio per parą} \times \text{Vidutinis gydomo gyvūno kūno svoris (kg)}}{\text{Vidutinis vieno gyvūno per parą suvartojamo vandens kiekis (l)}} = \text{..... mg vaisto/ l l geriamo vandens}$$

Kad užtikrinti tinkamą dozę, kūno svorį reikia nustatyti kuo tiksliau. Geriamo vandens su vaistu sunaudojimas priklauso nuo klinikinės gyvūno būklės. Kad užtikrinti tinkamą dozę, reikia atitinkamai nustatyti kolistino koncentraciją. Rekomenduojama naudoti tinkamai kalibruotas svarstyklės, jei sunaudojama nepilna pakuotė. Paros dozė turi būti ištirpinta tokiaame kiekyje vandens, kurį išgeria per 24 val. Vanduo su vaistu turi būti pakeičiamas kas 24 val. Rekomenduojama pasirošti koncentruotą darbinį tirpalą – apytiksliai 100 g/ 1 l vandens – ir jį atskiesti iki terapinės koncentracijos, jei reikia. Turi būti ruošiamas tik toks kiekis geriamo vandens su vaistu, kuris atitinka paros sunaudojimą. Tirpalas turi būti atnaujinamas ar pakeičiamas kas 24 val.
Pastaba: galima naudoti tik neatrajojantiems veršeliams, kuriems dar neprasidėjęs aktyvus mikrobinis virškinimas.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Perdozavimas gali sukelti inkstų nepakankamumą. Negalima naudoti didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis.

4.11. Išlauka

Skerdienai ir subproduktams: veršelių, paukščių ir kiaulių – 1 para.

Kiaušiniams – 0 parų.

Pienui – neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: žarnyno antiinfekcinės medžiagos, antibiotikai, kolistinas. ATCvet kodas: QA07AA10.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Veikimas

Polimiksinai, kurių grupei priklauso kolistinas, pasižymi „paviršiaus detergento poveikiu“, taip suardydami bakterijos citoplazminę membraną. Polimiksinai stipriai sąveikauja su fosfolipidais, įsiskverbia į juos ir suardo ląstelės membranos struktūrą. Paveikus vaistui iš karto keičiasi bakterijos membranos pralaidumas. Beto, kad veikia bakteriocidškai, kolistinas taip pat jungiasi su lipidu A ir neutralizuoja biologinį baterinio endotoksino poveikį.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Kadangi sugirdžius tik labai maža dalis kolistino absorbuojama iš virškinimo trakto jis indikuotinas tik virškinimo trakto ligų gydymui.

Sugirdžius veršeliams, kiaulėms ir trušiams kolistino sulfatas buvo labai silnai absorbuojamas ir beveik koncentracija kraujo serume buvo nenustatoma šioms rūšims. Sugirdžius su geriamuoju vandeniu vištoms liekanos kraujo serume buvo nustatomos iki 6 val. po naudojimo.

Pasiskirstymas

Kolistinas silpnai absorbuojamas iš virškinimo trakto. Priešingai nei kraujo serume ir audiniuose, kur susidaro labai maža koncentracija, didelis ir pastovus kolistino kiekis randamas įvairiose virškinimo trakto dalyse. Reikšmingai didesnis kiekis randamas aklojoje ir gaubtinėje žarnose nei skrandyje.

Metabolizmas

Nebuvo nustatyta kolistino metabolitų.

Pašalinimas

Beveik visas sugirdytas kolistinas pašalinamas su išmatomis.

6. FARMACINIAI DUOMENYS**6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Silicio dioksidas,
laktozės monohidratas.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Pagrindiniai nesuderinamumai nežinomi.
Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 savaitės.
Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus, – 24 val.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti sausoje vietoje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Butelį laikyti sandariai uždarytą.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Baltas DTPE butelis po 500 g ir 1000 g, užsuktas MTPE dangteliu su saugumo juostele. Laminuoti aliuminio maišeliai po 100 g.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
Lietuva

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/19/2542/001-003

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2019-06-05

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2024-09-02

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

BUTELIS, MAIŠELIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Coli-4800 WS 4 800 000 TV/g, milteliai geriamajam tirpalui ruošti veršeliams, paukščiams ir kiaulėms
Kolistino sulfatas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 g miltelių yra 4800000 TV kolistino sulfato.

3. VAISTO FORMA

Milteliai geriamajam tirpalui

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 g
500 g
1000 g

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Veršeliai, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sugirdyti su geriamu vandeniu.

Veršeliams: du kartus per parą girdyti 1 g/80 kg kūno svorio, gydyti 5 – 7 dienas.

Kiaulėms: 1 kg miltelių 4000 – 8000 l geriamo vandens gydyti 5 – 7 dienas. Su geriamu vandeniu reikia sugirdyti 4 200 000 – 8 400 000 TV kolistino sulfato/kiaulei/per parą arba skaičiuoti, kad 70 kg kiaulė gautų 60 000 – 120 000 TV kolistino sulfato/kg kūno svorio (vidutiniškai kiaulė per parą išgeria 7 l vandens).

Paukščiams: 1 kg miltelių 4000 – 8000 l geriamo vandens, gydyti 3 – 5 dienas. Taip pat galima skaičiuoti, kad 100 paukščių išgeria 7 l vandens, taigi vienas paukštis turėtų gauti 42 000 – 84 000 TV kolistino sulfato per parą.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

Skerdienai ir subproduktams: veršelių, paukščių ir kiaulių – 1 para.

Kiaušiniams – 0 parų.

Pienui – neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai} Atidarius

sunaudoti per 2 sav.

Ištirpinus sunaudoti per 24 val.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Butelį laikyti sandariai uždarytą.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
Lietuva

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/19/2542/001
LT/2/19/2542/002
LT/2/19/2542/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS

Coli-4800 WS 4 800 000 TV/g, milteliai geriamajam tirpalui ruošti veršeliams, paukščiams ir kiaulėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
Lietuva

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.
Metaalweg 8
Venray, 5804 CG
Nyderlandai

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Coli-4800 WS 4 800 000 TV/g, milteliai geriamajam tirpalui ruošti veršeliams, paukščiams ir kiaulėms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Balti milteliai, kurių 1 g yra 4800000 TV kolistino sulfato.

Pagalbinės medžiagos:

silicio dioksidas,
laktozės monohidratas.

4. INDIKACIJA (-OS)

Veršeliams, kiaulėms ir paukščiams (vištoms, kalakutams), sergantiems virškinimo trakto infekcinėmis ligomis, kurias sukelia kolistinui jautrios bakterijos *E. coli*, *Haemophilus* ir *Salmonella* spp., gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumu kolistinui.

Negalima naudoti gyvūnams, kuriems stipriai sutrikusi inkstų funkcija.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gali pasireikšti inkstų funkcijos sutrikimas, neurotoksinis poveikis ir nervų-raumenų blokada.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema: www.vmv.lt.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Veršeliai, paukščiai (vištos, kalakutai) ir kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Sugirdyti su geriamu vandeniu.

Veršeliams: du kartus per parą girdyti 1 g/80 kg kūno svorio, gydyti 5 – 7 dienas.

Kiaulėms: 1 kg miltelių 4000 – 8000 l geriamo vandens gydyti 5 – 7 dienas. Su geriamu vandeniu reikia sugirdyti 4 200 000 – 8 400 000 TV kolistino sulfato/kiaulei/per parą arba skaičiuoti, kad 70 kg kiaulė gautų 60 000 – 120 000 TV kolistino sulfato/kg kūno svorio (vidutiniškai kiaulė per parą išgeria 7 l vandens).

Paukščiams: 1 kg miltelių 4000 – 8000 l geriamo vandens, gydyti 3 – 5 dienas. Taip pat galima skaičiuoti, kad 100 paukščių išgeria 7 l vandens, taigi vienas paukštis turėtų gauti 42 000 – 84 000 TV kolistino sulfato per parą.

Atsižvelgiant į naudotiną dozę, gydomų gyvūnų skaičių ir svorį, tikslus veterinarinio vaisto dienos kiekis gali būti apskaičiuotas naudojant žemiau pateiktą formulę. Vaisto koncentraciją geriamajame vandenyje:

$$\frac{\text{..... mg vaisto/ kg kūno svorio per parą} \times \text{Vidutinis gydomo gyvūno kūno svoris (kg)}}{\text{Vidutinis vieno gyvūno per parą suvartojamo vandens kiekis (l)}} = \text{.... mg vaisto/ l l geriamo vandens}$$

Kad užtikrinti tinkamą dozę, kūno svorį reikia nustatyti kuo tiksliau. Geriamo vandens su vaistu sunaudojimas priklauso nuo klinikinės gyvūno būklės. Kad užtikrinti tinkamą dozę, reikia atitinkamai nustatyti kolistino koncentraciją. Rekomenduojama naudoti tinkamai kalibruotas svarstyklės, jei sunaudojama nepilna pakuotė. Paros dozė turi būti ištirpinta tokiaame kiekyje vandens, kurį išgeria per 24 val. Vanduo su vaistu turi būti pakeičiamas kas 24 val. Rekomenduojama pasiruošti koncentruotą darbinį tirpalą – apytiksliai 100 g/ 1 l vandens – ir jį atskiesti iki terapinės koncentracijos, jei reikia.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Turi būti ruošiamas tik toks kiekis geriamo vandens su vaistu, kuris atitinka paros sunaudojimą.

Tirpalas turi būti atnaujinamas ar pakeičiamas kas 24 val.

Pastaba: galima naudoti tik neatrajojantiems veršeliams, kuriems dar neprasidėjęs aktyvus mikrobinis virškinimas.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams: veršelių, paukščių ir kiaulių – 1 para.

Kiaušiniams – 0 parų.

Pienui – neregistruota naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Butelį laikyti sandariai uždarytą.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

Tinkamumo laikas, ištirpinus pagal nurodymus, – 24 val.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Negalima naudoti gyvūnams su aktyviu mikrobiniu virškinimu.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Negalima naudoti mažesnėmis nei terapinės dozės.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas kolistinui, turi vengti naudoti šį veterinarinį vaistą. Veterinarinį vaistą reikia naudoti apdairiai, taikant visas apsaugos priemones. Atsitiktinai patekus ant odos, tą vietą nuplauti dideliu kiekiu vandens. Atsitiktinai prarijus ar patekus į akis reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Veido, lūpų ar akių tynis ar kvėpavimo sutrikimai yra sunkūs simptomai ir tuo atveju reikalinga skubi medicinos pagalba.

Naudojus vaistą, reikia nusiplauti rankas. Vaistą naudoti apdairiai.

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Kolistinas veikia sinergiškai su daugeliu antimikrobinių medžiagų, tokių kaip beta-laktaminės medžiagos, eritromicinas, tetraciklinai, sulfonamidai, trimetoprimas ir bacitracinas. Jo veikimą slopiną divalenčiai katijonai, kaip Ba²⁺, Ca²⁺ ir Mg²⁺, nesočios riebiosios rūgštys ir ketvirtiniai amonio dariniai.

Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavimas gali sukelti inkstų nepakankamumą. Negalima naudoti didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis.

Nesuderinamumai

Pagrindiniai nesuderinamumai nežinomi.

Negalima maišyti su jokia kitu veterinariniu vaistu.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2024-09-02

15. KITA INFORMACIJA

Baltas DTPE butelis po 500 g ir 1000 g, užsuktas MTPE dangteliu su saugumo juoste. Laminuoti aliuminio maišeliai po 100 g.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.