

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z 20 polietilenskimi injektorji s po 10 ml.

Škatla s 24 polietilenskimi injektorji s po 10 ml.

Škatla s 96 polietilenskimi injektorji s po 10 ml.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Albiotic 330 mg / 100 mg intramamarna raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

10 ml injektor vsebuje:

Učinkovine:

linkomicin (v obliki linkomicinijevega klorida)

330 mg

neomicin (v obliki neomicinijevega sulfata)

100 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

20 injektorjev

24 injektorjev

96 injektorjev

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v laktaciji).

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Intramamarno dajanje.

7. KARENCA

Karenca:

Mleko: 84 ur.

Meso in organi: 3 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.
Zaščitite pred zamrznitvijo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Huvepharma NV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0188/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Intramamarni injektor 10 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Albiotic 330 mg / 100 mg intramamarna raztopina

2. KOLIČINA UČINKOVIN

Linkomicin (v obliki linkomicinijevega klorida)	330 mg / 10 ml
Neomicin (v obliki neomicinijevega sulfata)	100 mg / 10 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}