

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Кутия (саше от 100 g, полиетиленови буркани от 500 g и 1000 g).

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

TYLO 200 WSP – 200 mg/g прах за прилагане във вода за пиене/мляко или млекозаместител

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tylosin (като tartrate) 200 mg/g

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 g x 120

500 g x 12

1000 g x 12

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Телета, прасета и домашни птици (пилета и пуйчета)

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на *Mycoplasma synoviae* аеросакулит при кокошки (пилета) и *Mycoplasma gallisepticum* S6 при кокошки (пилета) и пуйки (пуйчета). В теренни изпитвания, тилозина се оказва полезен и за намаляване нивото на инфекция след стрес, свързан с ваксиниране с жива ваксина.

За лечение на огнища на некротичен ентерит при пилета, причинен от *Clostridium perfringens*.

За лечение и метафилактика на ензоотична пневмония и диария, причинени от микроорганизми (например *Lawsonia intracellularis*), чувствителни към тилозин при прасета.

За лечение на пневмония при телета, свързана с *Mycoplasma* и *Pasteurella multocida*, чувствителни към тилозин.

За информация относно дизентерия при свинете, виж т.3.5.

Преди да се използва този ветеринарен лекарствен продукт, трябва да се установи наличието на болестта в групата/стадото.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За перорално приложение – с вода за пиене (прасета и домашни птици (пилета и пуйчета)) или включен в млякото или разтворен в млекозаместител по време на хранене (телета).

Телета: 20 mg тилозин/kg т.м./два пъти на ден (което отговаря на 1 g тилозин/теле/прием) за 7 - 14 дни.

Прасета: 5-6 mg тилозин/kg т.м./ден за 7 - 10 дни.

Домашни птици (пилета и пуйчета): 25 mg тилозин/kg т.м./ден за 3 - 5 дни.

Смесен с млякото или разтворен в млекозаместител, продукта трябва да се използва незабавно. Медикаментозната вода трябва да бъде използвана в рамките на 24 часа.

При приготвянето на медикаментозна вода трябва да се вземе предвид телесната маса на животните, които ще се третират, и действителната им дневна консумация на вода. За да добавите необходимото количество (mg) активно вещество на L вода за пиене, трябва да се направят следните изчисления:

mg ветеринарен лекарствен продукт/kg телесна маса на ден	X	средна телесна маса (kg) на животните, които ще бъдат лекувани	mg ветеринарен лекарствен продукт на литър вода за пиене
Средна дневна консумация на вода (L/животно)			

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:	телета:	12 дни.
	прасета:	1 ден.
домашни птици (пилета и пуйчета):		2 дни.
Яйца:		2 дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне, използвайте преди...

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.
 Да се съхранява първичната опаковка плътно затворена.
 Да се пази от светлина.
 Да се съхранява на сухо място.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Кepro B.V.

14. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2749

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Саше от 100 g

Полиетиленови буркани от 500 g и 1000 g

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

TYLO 200 WSP – 200 mg/g прах за прилагане във вода за пиене/мляко или млекозаместител

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tylosin (като tartrate) 200 mg/g

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 g

500 g

1000 g

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Телета, прасета и домашни птици (пилета и пуйчета).

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на *Mycoplasma synoviae* аеросакулит при кокошки (пилета) и *Mycoplasma gallisepticum* S6 при кокошки (пилета) и пуйки (пуйчета). В теренни изпитвания, тилозина се оказва полезен и за намаляване нивото на инфекция след стрес, свързан с ваксиниране с жива ваксина.

Като лечение на огнища на некротичен ентерит при пилета, причинен от *Clostridium perfringens*.

За лечение и метафилактика на ензоотична пневмония и диария, причинени от микроорганизми (например *Lawsonia intracellularis*), чувствителни към тилозин при прасета.

За лечение на пневмония при телета, свързана с *Mycoplasma* и *Pasteurella multocida*, чувствителни към тилозин.

За информация относно дизентерия при свинете, виж т.3.5.

Преди да се използва този ветеринарен лекарствен продукт, трябва да се установи наличието на болестта в групата/стадото.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За перорално приложение – с вода за пиене (прасета и домашни птици (пилета и пуйчета)) или включен в млякото или разтворен в млекозаместител по време на хранене (телета).

Телета: 20 mg тилозин/kg т.м./два пъти на ден (което отговаря на 1 g тилозин/теле/прием) за 7 - 14 дни.

Прасета: 5-6 mg тилозин/kg т.м./ден за 7 - 10 дни.

Домашни птици (пилета и пуйчета): 25 mg тилозин/kg т.м./ден за 3 - 5 дни.
Смесен с млякото или разтворен в млекозаместител, продукта трябва да се използва незабавно.
Медикаментозната вода трябва да бъде използвана в рамките на 24 часа.

При приготвянето на медикаментозна вода трябва да се вземе предвид телесната маса на животните, които ще се третират, и действителната им дневна консумация на вода. За да добавите необходимото количество (mg) активно вещество на L вода за пиене, трябва да се направят следните изчисления:

mg ветеринарен лекарствен продукт/kg телесна маса на ден	X	средна телесна маса (kg) на животните, които ще бъдат лекувани	mg ветеринарен = лекарствен продукт на литър вода за пиене
Средна дневна консумация на вода (L/животно)			

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:	телета:	12 дни.
	прасета:	1 ден.
домашни птици (пилета и пуйчета):		2 дни.
Яйца:		2 дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне, използвайте преди...

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.
Да се съхранява първичната опаковка плътно затворена.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Kepto B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП
--

0022-2749

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП