

GEBRAUCHSINFORMATION
Exspot 715 mg/ml Lösung zum Auftropfen für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN, Boxmeer, vertreten durch
MSD Animal Health, Lynx Binnenhof 5, BE-1200 Brüssel

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Herstellern:

Intervet Productions s.r.l., Via Nettunense Km 20,300, 04011 Aprilia (LT), Italien

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Exspot 715 mg/ml Lösung zum Auftropfen für Hunde.

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Pro ml:

Wirkstoff:

Permethrin 715 mg

Hilfstoff:

1-Methoxypropan-2-ol ad 1 ml

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Bekämpfung und Prophylaxe eines Flohbefalls (*Ctenocephalides felis* und *Ctenocephalides canis*).
Bekämpfung und Prophylaxe eines Zeckenbefalls (*Ixodes ricinus* und *Rhipicephalus sanguineus*).

Eine einzige Anwendung tötet Flöhe und Zecken und schützt zwei bis vier Wochen nach der Behandlung vor einem erneuten Befall durch Flöhe und Zecken.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht bei Welpen anwenden, die jünger als 2 Wochen sind.

Nicht bei Katzen anwenden.

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen wurden Reaktionen im behandelten Bereich und/oder Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (d.h. Röte, Juckreiz und Haarausfall) gemeldet. Oft wurden Symptome wie Appetitlosigkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Aufregung, Muskelzittern, Krämpfe und/oder Ataxie beobachtet. Die Nebenwirkungen verschwinden oft innerhalb weniger Stunden, wenn der Hund mit Wasser und Shampoo gewaschen wird. In schweren Fällen: suchen Sie tierärztliche Hilfe auf.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunde.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG


Gewicht des Hundes (kg)	Volumen für die Anwendung	Verabreichungsstelle	Permethrin (mg/kg Kgw)
2,5 - < 15 kg (kleine Hunde)	1 ml	1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter	Zwischen 286 mg/kg Kgw und 47,6 mg/kg Kgw bei Hunden von 2,5 bis 15 kg
15 - < 30 kg (mittlere Hunde)	2 ml	1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter und 1 ml (1 Pipette) auf den Schwanzwurzelbereich	Zwischen 95,3 mg/kg Kgw und 47,6 mg/kg Kgw bei Hunden von 15 bis < 30 kg
30 kg - 45 kg (große Hunde)	3 ml	1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter, 1 ml (1 Pipette) auf den Schwanzwurzelbereich und 1 ml (1 Pipette) in der Mitte der Rückenlinie.	Beginnend bei 71,5 mg/kg Kgw bei Hunden von 30 kg; abnehmend mit zunehmendem Gewicht.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

- Hunde von 2,5 kg bis 15 kg: 1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblättern.
- Hunde von 15 kg bis 30 kg: 2 ml, d.h. 1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter und 1 ml (1 Pipette) auf den Schwanzwurzelbereich.
- Hunde von 30 kg bis 45 kg: 3 ml, d.h. 1 ml (1 Pipette) zwischen die Schulterblätter, 1 ml (1 Pipette) auf den Schwanzwurzelbereich und 1 ml (1 Pipette) in der Mitte der Rückenlinie.

Zum Auftragen auf die Haut.

Einen Beutel öffnen und die Pipette entnehmen.




Schritt 1: Das Tier sollte für eine einfache Handhabung stehen. Mit einer Hand die Pipette aufrecht, aber nicht in Richtung des Gesichts halten. Mit der anderen Hand die Spitze durch Hin- und Herbiegen abbrechen.



Schritt 2: Das Fell auf dem Rücken im Bereich zwischen den Schulterblättern scheideln, bis die Haut sichtbar wird und die Pipettenspitze auf die Haut setzen.



Schritt 3 (kleine Hunde): Die Pipette kräftig ausdrücken, um den gesamten Inhalt der Pipette auf die Haut aufzutragen.



Schritt 3 (mittlere Hunde): Verwenden Sie 2 Pipetten. Tragen Sie den gesamten Inhalt der Pipetten direkt auf die Haut auf, eine Anwendung zwischen den Schulterblättern und eine Anwendung an der Schwanzwurzel.



Schritt 3 (große Hunden): Verwenden Sie 3 Pipetten. Tragen Sie den gesamten Inhalt der Pipetten direkt auf die Haut auf, eine Anwendung zwischen den Schulterblättern, eine Anwendung entlang der Rückenlinie und eine Anwendung an der Schwanzwurzel.

10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nach dem EXP nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Das Anhaften von einzelnen Zecken kann nicht ausgeschlossen werden.

Vermeiden Sie längere und intensive Kontakt mit Wasser. Häufiger Kontakt mit Wasser kann die Langzeitwirksamkeit verringern. In diesen Fällen kann die Behandlung frühestens 7 Tage nach der vorherigen Behandlung wiederholt werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Dieses Tierarzneimittel ist nur für äußerliche Anwendung bestimmt.

Permethrin ist äußerst giftig für Katzen. Um einen versehentlichen Kontakt mit dem Produkt zu verhindern, sollten behandelte Hunde von Katzen getrennt werden, bis der behandelte Bereich getrocknet ist. Stellen Sie sicher, dass Katzen den behandelten Bereich bei Hunden nicht ablecken. Suchen Sie in diesem Fall umgehend einen Tierarzt auf.

Da Permethrin für Wasserorganismen giftig ist, sollten Hunde mindestens 24 Stunden nach der Anwendung keinenfalls in Kontakt kommen mit Oberflächenwasser.

Da keine Daten vorliegen, sollte das Tierarzneimittel nicht bei Hunden mit einem Gewicht von weniger als 2,5 kg angewendet werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Vermeiden Sie Hautkontakt. Nach der Anwendung die Hände waschen.

Vermeiden Sie Augenkontakt. Wenn das Product mit den Augen inBerührung kommt, spülen Sie diese sofort mit viel Wasser auf.

Bei versehentlicher Berührung mit der Haut diese sofort mit Seife und Wasser waschen.

Die behandelte Stelle sollte 3-6 Stunden nach der Behandlung nicht berührt werden. Deswegen empfiehlt sich eine Behandlung der Tiere am Abend. Vor kurzem behandelte Tiere dürfen nicht im selben Bett wie der Eigentümer schlafen; das gilt besonders für Kinder.

Um Hautkontakt zu vermeiden, sollten bei der Handhabung und Verabreichung des Tierarzneimittels Schutzhandschuhe getragen werden.

Trächtigkeit und Laktation:

Teratologische Tierversuche weisen nach, dass sowohl Permethrin als auch 1-Methoxypropan-2-ol keine teratogenen Risiken haben. Die USicherheit des Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation bei Hunden ist nicht nachgewiesen. Anwendung nur nach entsprechender Nutzen-Risiko-Bewertung durch den behandelnden Tierarzt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Nicht gleichzeitig mit anderen Insektiziden wie anderen Pyrethroiden, Organophosphorverbindungen oder Carbamaten anwenden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):

Hunde, die mit einer vierfachen Überdosierung behandelt wurden, wiesen keine klinische Nebenwirkungen auf.

Inkompatibilitäten:

Nicht mit anderen Tierarzneimitteln mischen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den lokale Vorschriften zu entsorgen.

Dieses Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen, da Permethrin eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann. Permethrinhaltige Produkte sind giftig für Bienen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

März 2023

15. WEITERE ANGABEN

Faltschachtel mit Spot On Applikatoren, bestehend aus 1-ml-Pipetten. Die Pipetten bestehen aus einer Blisterfilm (Polypropylen/zyklische-Olefinkopolymere/Polypropylen) und einer Folienabdeckung (Aluminium/Polypropylen zusammengespresst), die in kindersicheren Aluminiumbeuteln verschweißt ist.

6 x 1 ml

Für vollständige Informationen zu diesem Tierarzneimittel wenden Sie sich bitte an den örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers.

Verteiler:
I.D.Pharm bvba
Iddergemsesteenweg, 77
9450 Haaltert
Belgien

BE-V477226

ABGABEMODUS

Rezeptfrei

