

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril RSI - 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Enrofloxacin 100 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rind: **s.c.** oder **i.v.**

Schwein: **i.m.**

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe: **s.c.:** 14 Tage.
i.v.: 7 Tage.

Milch: **s.c.:** 120 Stunden (5 Tage).
 i.v.: 72 Stunden (3 Tage).

Schwein:

Essbare Gewebe: **i.m.:** 12 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Elanco Logo

14. ZULASSUNGSNR.

Z. Nr.: 8-00424

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**DURCHSTECHFLASCHE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Baytril RSI - 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Enrofloxacin 100 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: **s.c.** oder **i.v.**

Schwein: **i.m.**

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe:

s.c.: 14 Tage.

i.v.: 7 Tage.

Milch:

s.c.: 120 Stunden (5 Tage).

i.v.: 72 Stunden (3 Tage).

Schwein:

Essbare Gewebe: **i.m.:** 12 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Elanco Logo

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}