

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit 40 x 25 g

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Parofo 70 000 IE/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes Gramm enthält

70 000 IE Paromomycin-Aktivität als Paromomycinsulfat (1:x)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

40 x 25g

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend), Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend):

Essbare Gewebe: 20 Tage

Schwein:

Essbare Gewebe: 3 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:.....

Das medikierte Trinkwasser sollte alle 24 Stunden neu zubereitet werden.

Nach Rekonstituieren in Milch/Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Den Beutel fest verschlossen halten.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401969.00.00

AT: Z.Nr.: 835811

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**BEUTEL von 25 g****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Parofo 70 000 IE/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes Gramm enthält:

70 000 IE Paromomycin-Aktivität als Paromomycinsulfat (1:x)

3. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend), Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend):

Essbare Gewebe: 20 Tage

Schwein:

Essbare Gewebe: 3 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

Das medikierte Trinkwasser sollte alle 24 Stunden neu zubereitet werden.

Nach Rekonstituieren in Milch/Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Den Beutel fest verschlossen halten.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

BEUTEL von 1000 g - 500 g - 250 g

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Parofo 70 000 IE/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes Gramm enthält:

70 000 IE Paromomycin-Aktivität als Paromomycinsulfat (1:x)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 g

500 g

1000 g

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend), Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend):

Essbare Gewebe: 20 Tage

Schwein:

Essbare Gewebe: 3 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:.....

Das medikierte Trinkwasser sollte alle 24 Stunden neu zubereitet werden.

Nach Rekonstituieren in Milch/Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Den Beutel fest verschlossen halten.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401969.00.00

AT: Z.Nr.: 835811

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}