RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VEYLACTIN 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti
VEYLACTIN 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (CZ, DE, EL, ES, HU, PT, SK)
VEYLACTIN vet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (FI, IS, NO)
KELACTIN 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (BE, CY, FR, LU, NL, UK)
KELACTIN vet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (SE)

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 ml di prodotto veterinario contiene:

Principio attivo:
cabergolina 50 microgrammi

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale
Soluzione oleosa viscosa, giallo pallido.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani e gatti.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Il prodotto veterinario è indicato per i seguenti usi:
- Trattamento della pseudogravidanza nelle cagne
- Soppressione della lattazione nelle cagne e nelle gatte

4.3 Controindicazioni

- Non usare in animali gravidi in quanto il prodotto può causare aborto.
- Non utilizzare con antagonisti della dopamina.
- Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

La cabergolina può indurre ipotensione transitoria negli animali trattati. Non utilizzare in animali trattati contemporaneamente con farmaci ipotensivi. Non utilizzare subito dopo un intervento chirurgico se l'animale è ancora sotto l'effetto di anestetici.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Ulteriori trattamenti di supporto dovrebbero includere la restrizione di apporto di acqua e carboidrati e l'aumento di esercizio.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

ι) Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Non pertinente.

ιι) Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Lavarsi le mani dopo l'uso. Evitare il contatto con la cute e con gli occhi. Lavare eventuali schizzi immediatamente.
Donne fertili e in allattamento non dovrebbero maneggiare il prodotto o dovrebbero utilizzare guanti monouso durante la somministrazione del prodotto.
Le persone con nota ipersensibilità alla cabergolina o ad uno degli eccipienti del prodotto, dovrebbero evitare contatti con il medicinale veterinario.
Non lasciare siringhe piene incustodite in presenza di bambini. In caso di ingestione accidentale, in particolare da parte di un bambino, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Possibili effetti collaterali sono:
- sonnolenza
- anoressia
- vomito

Questi effetti collaterali sono solitamente di natura modesta e transitoria.

Il vomito solitamente si riscontra solo dopo la prima somministrazione. In questo caso il trattamento non dovrebbe essere sospeso, in quanto il vomito non si ripresenterà dopo le somministrazioni successive.
In casi molto rari si possono osservare reazioni allergiche come edema, orticaria, dermatite e prurito.
In casi molto rari si può osservare ipotensione transitoria.
In casi molto rari si possono osservare segni neurologici come sonnolenza, tremori muscolari, atassia, iperattività e convulsioni.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:
- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate)

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

- La cabergolina ha la capacità di causare l'aborto negli stadi avanzati della gravidanza, pertanto non dovrebbe essere usata in animali gravidi. Occorre effettuare una diagnosi differenziale corretta tra gravidanza e pseudogravidanza.
- Il prodotto è indicato per la soppressione della lattazione: l'inibizione della secrezione di prolattina causa una rapida cessazione della lattazione e conseguente riduzione del volume mammario. Non impiegare in animali in lattazione a meno che non sia necessaria l'interruzione della medesima.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Poiché la cabergolina esercita il suo effetto terapeutico in conseguenza di uno stimolo diretto dei recettori dopaminergici, il prodotto non dovrebbe essere somministrato unitamente a medicinali con attività antagonista della dopamina (quali fenotiazine, butirrofenoni, metoclopramide) in quanto potrebbero ridurne l'effetto inibente sulla prolattina.

Poiché la caberoglina può indurre ipotensione transitoria, il prodotto non dovrebbe essere usato in animali trattati simultaneamente con farmaci ipotensivi.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Il prodotto veterinario può essere somministrato per via orale direttamente in bocca o mischiato all'alimento.

Il dosaggio è 0,1 ml/kg di peso corporeo (equivalente a 5 microgrammi/kg di peso corporeo di cabergolina) una volta al dì per 4-6 giorni consecutivi, a seconda della gravità del quadro clinico.

Se i sintomi non scompaiono dopo una singola terapia, o si ripresentano dopo la fine del trattamento, la terapia può essere ripetuta.

Il peso dell'animale trattato deve essere determinato in modo preciso prima della somministrazione.

Come prelevare la dose consigliata dal flaconcino?

Per prelevare il medicinale veterinario dal flaconcino si raccomanda di utilizzare l'adattatore per flaconcino e la siringa inclusi nella confezione. A tal fine sono necessari i seguenti passaggi:

Preparazione del flaconcino per il primo uso:
Appoggiare il flaconcino su una superficie piana. Porre l'adattatore verticalmente sul flaconcino, in modo da perforare il centro del tappo con il perno dell'adattatore. Fissare saldamente l'adattatore sul flaconcino esercitando pressione.
L'adattatore rimarrà ora permanentemente attaccato al flaconcino, sigillandola ermeticamente e mantenendo il prodotto pronto per l'uso fino ad esaurimento della soluzione contenuta.

Prelievo della dose necessaria/prescritta:
a. Attaccare la siringa all'adattatore spingendo saldamente la siringa nell'adattatore del flaconcino, così da evitare fuoriuscite di prodotto durante il prelievo della dose dal flaconcino.
b. Prelevare il medicinale dal flaconcino alla siringa tenendo il flaconcino capovolta.
c. Rimuovere la siringa dall'adattatore mantenendola in posizione verticale. Lasciare l'adattatore sul flaconcino.
d. Il farmaco è ora pronto per la somministrazione.

Si consiglia di lavare e asciugare la siringa dopo ogni applicazione. Per il prelievo successivo, iniziare dal punto a.



a. b. c. d.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

I dati sperimentali indicano che un singolo sovradosaggio di cabergolina può portare all'aumento della probabilità di vomito post-trattamento, e possibilmente all'aumento di ipotensione post-trattamento.

Misure generali di supporto dovrebbero essere intraprese per rimuovere eventuale farmaco non assorbito e mantenere la pressione sanguigna, se necessario. Come antidoto, si può considerare la somministrazione per via parenterale di farmaci antagonisti della dopamina quali la metoclopramide.

4.11 Tempi di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: inibitore della prolattina appartenente al gruppo dei derivati ergolinici che agisce con attività antagonista della dopamina.
Codice ATCvet: QG02CB03.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La farmacodinamica della cabergolina è stata studiata mediante modelli sperimentali sia *in vivo* sia *in vitro.* A tale proposito i risultati più significativi possono essere così riassunti:

- La cabergolina è un potente inibitore della secrezione di prolattina da parte dell'ipofisi, di conseguenza inibisce tutti i processi prolattino-dipendenti come quello della lattazione.
- Il meccanismo di azione della cabergolina è tramite interazione diretta con i recettori dopaminergici D-2 sulle cellule lattotrope ipofisarie; questa interazione ha un effetto persistente.
- La cabergolina presenta alcune affinità per i recettori noradrenergici, ma non interferisce sul metabolismo della noradrenalina e della serotonina.
- Come per altri derivati ergolinici, la cabergolina ha effetti emetici (equivalenti in potenza a quelli della pergolide e della bromocriptina).
- Alle alte dosi per via orale, la cabergolina causa una riduzione della pressione sanguigna.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Non sono disponibili dati farmacocinetici per il regime di dosaggio consigliato nei cani e nei gatti.
Studi di farmacocinetica sui cani sono stati effettuati per una dose giornaliera di 80 µg/kg di peso corporeo (16 volte la dose raccomandata). I cani sono stati trattati per 30 giorni; valutazioni farmacocinetiche sono state effettuate il giorno 1 e 28.

Assorbimento:

- T_{max} = 1 ora il giorno 1 e 0,5-2 ore (media 75 minuti) il giorno 28;
- C_{max} variata da 1140 a 3155 pg/ml (media 2147 pg/ml) il giorno 1 e da 455 a 4217 pg/ml (media 2336 pg/ml) il giorno 28;
- $AUC_{(0\text{-}24\ h)}$ il giorno 1 variata da 3896 a 10216 $pg.h.ml^{-1}$ (media 7056 $pg.h.ml^{-1}$) e il giorno 28 da 3231 a 19043 $pg.h.ml^{-1}$ (media 11137 $pg.h.ml^{-1}$) .

Eliminazione:

- Emivita plasmatica nel cane t½ al giorno 1 ~ 19 ore; t½ al giorno 28 ~ 10 ore.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Trigliceridi, catena media.
Azoto, a basso contenuto di ossigeno.

6.2 Incompatibilità principali

Non miscelare il prodotto con una soluzione acquosa (ad es. latte)
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 14 giorni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare in frigorifero (2 °C – 8 °C).
Dopo prima apertura: conservare a temperatura inferiore a 25 °C.
Conservare in posizione verticale.
Tenere il flaconcino ben chiusa nell'imballaggio esterno per proteggerla dalla luce.
Non congelare.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Confezionamento primario:
Flaconcino di vetro ambrato di tipo III di capacità 15 ml (contenenti 7 o 14 ml) o flaconcino di vetro ambrato di tipo II di capacità 30 ml (contenenti 24 ml) tappo di gomma bromobutilica grigia e ghiera in alluminio, fornite con adattatore per fiale e siringa dosatrice HDPP (siringa da 1ml nella confezione da 7 ml, e siringa da 3ml nella confezione da 14 e 24 ml).
Confezionamento secondario:
Scatola di cartone contenente un flaconcino singola da 7 ml, 14 ml o 24 ml.
E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germania

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flaconcino da 7 ml	AIC	104922012
Flaconcino da 14 ml	AIC	104922024
Flaconcino da 24 ml	AIC	104922036

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: novembre 2015
Data dell'ultimo rinnovo: 16 Febbraio 2017

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

25 Luglio 2023

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile

A. ETICHETTATURA

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO

SCATOLA DI CARTONE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VEYLACTIN 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti
cabergolina

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

cabergolina 50 microgrammi/ml

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale

4. CONFEZIONI

7 ml
14 ml
24 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

6. INDICAZIONI

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

8. TEMPO DI ATTESA

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Non lasciare siringhe piene incustodite in presenza di bambini.
Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

EXP:
Periodo di validità dopo prima apertura: 14 giorni.
Dopo l'apertura usare entro …

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero (2 °C – 8 °C).
Dopo prima apertura: conservare a temperatura inferiore a 25 °C.

Conservare in posizione verticale.
Tenere il flaconcino ben chiusa nell'imballaggio esterno per proteggerla dalla luce.
Non congelare.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE

Solo per uso veterinario.
Da vendere solo su prescrizione medico veterinaria.

14. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI"

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germania

16. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flaconcino da 7 ml	AIC	104922012
Flaconcino da 14 ml	AIC	104922024
Flaconcino da 24 ml	AIC	104922036

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lot:

prevedere spazio per GTIN e
Codice a barre
D.M. 17/12/2007

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI PICCOLE DIMENSIONI

ETICHETTA

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VEYLACTIN 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti
cabergolina

2. QUANTITÀ DI PRINCIPIO ATTIVO

cabergolina 50 microgrammi/ml

3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI

7 ml
14 ml
24 ml

4. VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale.

5. TEMPO DI ATTESA

6. NUMERO DI LOTTO

Lot:

7. DATA DI SCADENZA

EXP:

8. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER:

VEYLACTIN 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Germania

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

VEYLACTIN 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti
Cabergolina
VEYLACTIN 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (CZ, DE, EL, ES, HU, PT, SK)
VEYLACTIN vet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (FI, IS, NO)
KELACTIN 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (BE, CY, FR, LU, NL, UK)
KELACTIN vet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats (SE)

3. INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 ml contiene:
cabergolina 50 microgrammi
Soluzione orale.
Soluzione oleosa viscosa, giallo pallido.

4. INDICAZIONI

Il prodotto veterinario è indicato per i seguenti usi:
- Trattamento della pseudogravidanza nelle cagne
- Soppressione della lattazione nelle cagne e nelle gatte

5. CONTROINDICAZIONI

- Non usare in animali gravidi in quanto il prodotto può causare aborto.
- Non utilizzare con antagonisti della dopamina.
- Non usare in casi di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

La cabergolina può indurre ipotensione transitoria negli animali trattati. Non utilizzare in animali trattati contemporaneamente con farmaci ipotensivi. Non utilizzare subito dopo un intervento chirurgico se l'animale è ancora sotto l'effetto di anestetici.

6. REAZIONI AVVERSE

Possibili effetti collaterali sono:
- sonnolenza
- anoressia
- vomito

Questi effetti collaterali sono solitamente di natura modesta e transitoria.

Il vomito solitamente si riscontra solo dopo la prima somministrazione. In questo caso il trattamento non dovrebbe essere sospeso, in quanto il vomito non si ripresenterà dopo le somministrazioni successive.
In casi molto rari si possono osservare reazioni allergiche come edema, orticaria, dermatite e prurito.
In casi molto rari si può osservare ipotensione transitoria.
In casi molto rari si possono osservare segni neurologici come sonnolenza, tremori muscolari, atassia, iperattività e convulsioni.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:
- molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti.

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il prodotto veterinario può essere somministrato per via orale direttamente in bocca o mischiato all'alimento.

Il dosaggio è 0,1 ml/kg di peso corporeo (equivalente a 5 microgrammi/kg di peso corporeo di cabergolina) una volta al dì per 4-6 giorni consecutivi, a seconda della gravità del quadro clinico.

Se i sintomi non scompaiono dopo una singola terapia, o si ripresentano dopo la fine del trattamento, la terapia può essere ripetuta.

Si consiglia di lavare e asciugare la siringa dopo ogni applicazione.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Come prelevare la dose consigliata dal flaconcino?

Per prelevare il medicinale veterinario dal flaconcino si raccomanda di utilizzare l'adattatore per flaconcino e la siringa inclusi nella confezione. A tal fine sono necessari i seguenti passaggi:

Preparazione del flaconcino per il primo uso:
Appoggiare il flaconcino su una superficie piana. Porre l'adattatore verticalmente sul flaconcino, in modo da perforare il centro del tappo con il perno dell'adattatore. Fissare saldamente l'adattatore sul flaconcino esercitando pressione.
L'adattatore rimarrà ora permanentemente attaccato al flaconcino, sigillandola ermeticamente e mantenendo il prodotto pronto per l'uso fino ad esaurimento della soluzione contenuta.

Prelievo della dose necessaria/prescritta:

a. Attaccare la siringa all'adattatore spingendo saldamente la siringa nell'adattatore del flaconcino, così da evitare fuoriuscite di prodotto durante il prelievo della dose dal flaconcino.
b. Prelevare il medicinale dal flaconcino alla siringa tenendo il flaconcino capovolta.
c. Rimuovere la siringa dall'adattatore mantenendola in posizione verticale. Lasciare l'adattatore sul flaconcino.
d. Il farmaco è ora pronto per la somministrazione.

Si consiglia di lavare e asciugare la siringa dopo ogni applicazione. Per il prelievo successivo, iniziare dal punto a.



a. b. c. d.

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero (2 °C – 8 °C).
Dopo prima apertura: conservare a temperatura inferiore a 25 °C.
Periodo di validità dopo prima apertura: 14 giorni.
Conservare in posizione verticale.
Tenere il flaconcino ben chiusa nell'imballaggio esterno per proteggerla dalla luce.
Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.
Non congelare.
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

12. AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:
Ulteriori trattamenti di supporto dovrebbero includere la restrizione di apporto di acqua e carboidrati e l'aumento di esercizio.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:
Lavarsi le mani dopo l'uso. Evitare il contatto con la cute e con gli occhi. Lavare eventuali schizzi immediatamente.
Donne fertili e in allattamento non dovrebbero maneggiare il prodotto o dovrebbero utilizzare guanti monouso durante la somministrazione del prodotto.
Le persone con nota ipersensibilità alla cabergolina o ad uno degli eccipienti del prodotto, dovrebbero evitare contatti con il medicinale veterinario.
Non lasciare siringhe piene incustodite in presenza di bambini. In caso di ingestione accidentale, in particolare da parte di un bambino, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza e allattamento:

La cabergolina ha la capacità di causare l'aborto negli stadi avanzati della gravidanza, pertanto non dovrebbe essere usata in animali gravidi. Occorre effettuare una diagnosi differenziale corretta tra gravidanza e pseudogravidanza.
Il prodotto è indicato per la soppressione della lattazione (cessazione della produzione di latte): l'inibizione della secrezione di prolattina causa una rapida cessazione della lattazione e conseguente riduzione del volume mammario. Non impiegare in animali in lattazione a meno che non sia necessaria l'interruzione della medesima.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:
Poiché la cabergolina esercita il suo effetto terapeutico in conseguenza di uno stimolo diretto dei recettori dopaminergici, il prodotto non dovrebbe essere somministrato unitamente a medicinali con attività antagonista della dopamina (quali fenotiazine, butirrofenoni, metoclopramide) in quanto potrebbero ridurne l'effetto inibente sulla prolattina.
Poiché la caberoglina può indurre ipotensione (bassa pressione sanguigna) transitoria, il prodotto non dovrebbe essere usato in animali trattati simultaneamente con farmaci ipotensivi.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):
I dati sperimentali indicano che un singolo sovradosaggio di cabergolina può portare all'aumento della probabilità di vomito post-trattamento, e possibilmente all'aumento di ipotensione post-trattamento.
Misure generali di supporto dovrebbero essere intraprese per rimuovere eventuale farmaco non assorbito e mantenere la pressione sanguigna, se necessario. Come antidoto, si può considerare la somministrazione per via parenterale di farmaci antagonisti della dopamina quali la metoclopramide.

Incompatibilità:
Non miscelare il prodotto con una soluzione acquosa (ad es. latte)
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico.
Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

25 Luglio 2023

15. ALTRE INFORMAZIONI

Dimensioni confezione: 7 ml, 14 ml e 24 ml.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Da vendere solo su prescrizione medico veterinaria.