

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/97/0600

Alfafer 10% 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Alfasan International BV

P.O. Box 78

3440 AB Woerden

Nīderlande

Tālr: 0031-348416945

E-pasts: Alfasan@wxs.nl

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Alfafer 10% 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvās vielas:

Dzelzs (dekstrāna kompleksa veidā) 100 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Dzels deficīta izraisītas anēmijas novēršanai un ārstēšanai sivēniem un teļiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot sivēniem gadījumos, ja ir E vitamīna un selēna deficīts. Ievadot atbilstošas E vitamīna un selēna devas, dzelzi saturošas zāles var injicēt ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retāk cūkām novēro reakciju uz dzelzi saturošu zāļu injekcijām, klīniski izpaužas kā prostrācija, ar muskuļu vājumu. Intramuskulārā injekcija var iekrāsot muskuļu šķiedras. Reti novēro anafilaktisku reakciju.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi), cūkas (sivēni).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Sivēniem: 2 ml (200 mg dzelzs) no 3 dienu vecuma, intramuskulārām vai subkutānām injekcijām.

Teļiem: 3 – 6 ml (300-600 mg dzelzs), intramuskulārām injekcijām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Injekcijas vietā ādu ieteicams nostiept, lai samazinātu zāļu noplūdi pēc adatas izvilkšanas. Ir jāpielieto parastās aseptikas injekcijas metodes. Jāizvairās no kontaminācijas zāļu lietošanas laikā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret dzelzs (III) hidroksīda dekstrāna kompleksu vai kādu no palīgvielām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Izvairīties no saskares ar ādu, gļotādu un acīm.

Ja notikusi nejauša nokļūšana uz ādas vai acīs, rūpīgi jāskalo ar ūdeni.

Mazgāt rokas pēc lietošanas.

Jutīgām personām dzelzs dekstrāns pēc injicēšanas var izraisīt anafilaktiskas reakcijas.

Ievadīšana jāveic uzmanīgi, lai novērstu nejaušu pašinjicēšanu.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

06/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.