

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

SUIDAN lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

V.M.D.n.v.
Hoge Mauw 900
2370 Arendonk
Belgie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SUIDAN lyofilizát pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 lahvička obsahuje:

Léčivé látky:

Gonadotrophinum sericum	400 IU
Gonadotrophinum chorionicum	200 IU

1 lahvička s rozpouštědlem obsahuje:

Chlorid sodný	32 mg
Voda na injekci	4 ml

4. INDIKACE

Indukce říje u slabé nebo chybějící říje (anestrus prasnic a prasniček vhodné konstituce - min. 6 měsíců stáří a 90 kg hmotnosti), hormonální dysfunkce.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek. S ohledem na nebezpečí vzniku cyst nesmí být přípravek aplikován během estru, ani na začátku nebo uprostřed cyklu (během luteální fáze).

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech může dojít po injekčním podání Suidanu (stejně jako u všech léčiv obsahujících bílkoviny) k anafylaktické reakci..
Dojde-li k anafylaktické reakci, doporučuje se okamžitě i.v podání 2-3 ml roztoku adrenalinu (1:1000).

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro subkutánní podání.

1 lahvička substance + 1 lahvička rozpouštědla pro jedno ošetření.

K indukci říje po odstavu, především po prvním vrhu, aplikovat nejlépe v den odstavení, nejpozději však 2. den po odstavení. Prasnícím, které nezabřezly do 10 dnů po odstavu, se aplikuje Suidan od 10. do 12. dne. Ve všech indikacích se očekává nástup estru za 3 až 6 dnů. Měla by pak být provedena inseminace.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Rozpouštědlo i rozpuštěný lyofilizát musí být čiré bezbarvé roztoky.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při eventuální kontaminaci kůže a sliznic omyjte zasažená místa vodou.
Přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2020

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

5 lahviček s lyofilizátem a 5 lahviček s rozpouštědlem.
Vnější přebal papírová skládačka.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.