

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/99/1034

Tenazym suspensija lietošanai iekšķīgi vai uz ādas suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS UN RAŽOŠANAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS, KAS ATBILDĪGS PAR PARTIJAS REALIZĒŠANU, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tenazym suspensija lietošanai iekšķīgi vai uz ādas suņiem un kaķiem.

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Tetraciklīna hidrohlorīds	30,0 mg
Neomicīna sulfāts	22,5 mg
Prednizolona acetāts	2,0 mg
Himotripsīns	120 FIP-vienības
Tripsīns	12 FIP-vienības
Papaīns	1,5 FIP-vienības

4. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem un kaķiem pret tetraciklīnu un neomicīnu jutīgu mikroorganismu ierosinātu infekcijas slimību ārstēšanai (jaundzīvniekiem – enterīts, pneimonija, artrīts un ofīts; sekundāras infekcijas vīrusu slimību gadījuma, brūču infekcijas).

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRKA SUGAS

Suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai: 0,4 ml / kg ķermeņa svara (kā tiešā deva).
Lietot ar 12 stundu intervālu 3 – 5 dienas.

Lietošanai uz ādas
(brūču apstrādei): Lietot 2-3 reizes dienā, vismaz 5 dienas.

Pirms lietošanas saskalināt.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav piemērojami.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Glabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Kad vien iespējams, šīs zāles lietot, balstoties uz jutīguma testu rezultātiem.

Prednizolona farmakoloģisko īpašību dēļ jāievēro īpaša piesardzība, lietojot veterinārās zāles dzīvniekiem ar novājinātu imūnsistēmu.

Tādi kortikoīdu grupas medikamenti kā prednizolons paātrina olbaltumvielu katabolismu, tāpēc veciem vai novājinātiem dzīvniekiem zāles jālieto uzmanīgi.

Kortikoīdu grupas medikamentus un tajā skaitā prednizolonu jālieto piesardzīgi, ja konstatēta hipertensija.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret prednizolonu vai citiem kortikosteroīdiem vai pret kādu no palīgvielām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Kortikosteroīdi var izraisīt augļa anomālijas; šī iemesla dēļ grūtniecēm vajadzētu izvairīties no kontakta ar šīm veterinārajām zālēm. Pēc tablešu lietošanas nekavējoties rūpīgi nomazgājiet rokas.

Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc zāļu lietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot iekšķīgi grūsniem dzīvniekiem grūsnības trešajā trimestrī. Lietošana uz ādas grūsniem dzīvniekiem trešajā trimestrī jāveic tikai stingri ievērojot indikācijas, jo pastāv nevēlams zāļu noplūdes un tādejādi iekšķīgas lietošanas risks.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKĀ APSTIPRINĀTA

11/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmērs:

Kaste ar 10 injektoriem.