

B. PAKNINGSVEDLEGG

PAKNINGSVEDLEGG

Zantel tabletter til hund

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irland.

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Zantel tabletter til hund.

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

En tablett inneholder:

Fenbendazol: 500 mg

Prazikvantel: 50 mg

4. INDIKASJON(ER)

Til behandling av rundormer og bendelormer hos hund.

Spolorm *Toxocara canis* (kjønnsmodne, larver), *Toxascaris leonina* (kjønnsmodne, larver)

Hakeorm *Uncinaria stenocephala* (kjønnsmodne, larver), *Ancylostoma caninum* (kjønnsmodne, larver)

Piskeorm *Trichuris vulpis* (kjønnsmodne)

Bendelorm *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*,
Taenia pisiformis, *Taenia hydatigena*

5. KONTRAINDIKASJONER

Skal ikke brukes til valper under 2 uker.

6. BIVIRKNINGER

Oppkast er blitt rapportert hos hunder som har fått anbefalt dose.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Hund.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Zantel tabletter gis gjennom munnen, enten direkte i munnen eller sammen med mat. Forholdsregler som diett eller faste er ikke nødvendige.

For å sikre korrekt dosering er det viktig at kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig.

Dosering til voksne hunder og valper etter avvenning: 50 mg fenbendazol og 5 mg prazikvantel per kg kroppsvekt (tilsvarer 1 tablett per 10 kg) daglig 2 dager i strekk.

Små hunder og avvendte valper

0,5 – 2,5 kg	¼ tablett
2,5 – 5,0 kg	½ tablett
6,0 – 10 kg	1 tablett

Middels store hunder

11 – 15 kg	1½ tabletter
16 – 20 kg	2 tabletter
21 – 25 kg	2½ tabletter
26 – 30 kg	3 tabletter

Store hunder

31 – 35 kg	3½ tabletter
36 – 40 kg	4 tabletter

Det er ikke utført studier med hunder som veier over 40 kg.

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Se under punkt 8.

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Oppbevares utilgjengelig for barn.

12. SPESIELLE ADVARSLER

I og med at bendelormen *Dipylidium caninum* hos hund/katt har lopper som mellomvert og en svært kort prepatensperiode, er det viktig å fokusere på kontroll av loppepopulasjonen for å redusere forekomsten av denne bendelormen samt risikoen for reinfeksjon.

Resistens hos parasitter mot en spesifikk ormemiddelgruppe kan oppstå som følge av gjentatt bruk av denne gruppen ormemidler.

Vask hendene etter bruk.

Sikkerhet ved bruk under drektighet er ikke klarlagt og bruk til drektige tisper er derfor ikke anbefalt. Kan brukes til diegivende tisper.

Ved bruk av mange ganger den anbefalte dosen er det sett forbigående diaré.

Fra 3 ganger anbefalt dose ble det rapportert løs avføring hos voksne hunder og piping og rastløshet hos valper. Ved 5 ganger anbefalt dose ble det observert voldsom sikling hos voksne hunder og valper. Oppkast kan også forekomme. Ved tegn på overdose skal symptomene behandles.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

28.11.2023

15. YTTERLIGERE INFORMASJON

Pakningsstørrelser:

Plastboks: 20, 24, 30, 50, 60, 96, 100, 120 og 200 tabletter.

Foliestriper: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 48, 50, 60, 96, 100, 120, 200 og 400 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

Orion Pharma, Animal Health
Postboks 4366 Nydalen
0402 Oslo
Tlf: 4000 4190