

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe na 20, 50 i 100 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Pyrocam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden ml zawiera:

Substancja czynna:

Meloksykam 20 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

20 ml

50 ml

100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnie i konie

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Bydło: pojedyncze wstrzyknięcie podskórne lub dożylnie.

Świnie: pojedyncze wstrzyknięcie domięśniowe. W razie potrzeby drugie podanie może nastąpić po 24 godzinach.

Konie: pojedyncze wstrzyknięcie dożylnie.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło: tkanki jadalne: 15 dni; mleko: 5 dni (120 godzin)

Świnie: tkanki jadalne: 5 dni

Konie: mięso i podroby: 5 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do:

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Huvepharma NV

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Pozwolenie nr:

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Fiolki o pojemności 20 ml, 50 ml i 100 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Pyrocam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden ml zawiera:

Substancja czynna:

Meloksykam 20 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, świnie i konie.

4. DROGI PODANIABydło: wstrzyknięcie podskórne lub dożylnie.Świnie: wstrzyknięcie domięśniowe.Konie: wstrzyknięcie dożylnie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Bydło: tkanki jadalne: 15 dni; mleko: 5 dni (120 godzin)Świnie: tkanki jadalne: 5 dniKonie: mięso i podroby: 5 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 28 dni.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do:

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Huvepharma NV

9. NUMER SERII

Lot {numer}