

**KENNZEICHNUNG****<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>****Karton mit 3x 10 ml, 12 x 10 ml, 24 x 10 ml und 96 x 10 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Albiotic, Lösung zur intramammären Anwendung bei laktierenden Kühen  
*Lincomycinum - Neomycinum*

**2. WIRKSTOFF(E)**

**Wirkstoffe:** *Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 330 mg) – *Neomycini sulfas* (= *Neomycinum* 100 mg) – *Excip. q.s. ad 10 ml.*

**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösung zur intramammären Anwendung

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

3 x 10 ml, 12 x 10 ml, 24 x 10 ml und 96 x 10 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Laktierende Kühe.

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung.

**Dosierung:** Ein Injektor von 10 ml pro infiziertes Viertel, dreimal im Abstand von 12 Stunden.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

**Wartezeit(en):**

Milch: 84 Stunden

Essbare Gewebe : 3 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP.

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**Lag.:** Nicht über 30°C lagern. Vor Frost schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den lokalen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere - Verschreibungspflichtig .

**14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

Huvepharma NV  
Uitbreidingsstraat 80  
2600 Antwerpen  
Belgien

**16. ZULASSUNGSNRUMMER(N)**

BE-V202517

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot:

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Label Spritze 10 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Albiotic, Lösung zur intramammären Anwendung bei laktierenden Kühen  
*Lincomycinum - Neomycinum*

**2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE**

**Wirkstoffe:** *Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 330 mg) – *Neomycini sulfas* (= *Neomycinum* 100 mg) – *Excip. q.s. ad 10 ml.*

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

10 ml

**4. ART DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung

**5. WARTEZEIT(EN)**Milch: 84 StundenEssbare Gewebe: 3 Tage**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot:

**7. VERFALLDATUM**

EXP.

**8. VERMERK "FÜR TIERE"**

Für Tiere - Verschreibungspflichtig .