



PROSPECT:

LEVANMIZOL WSP, 100 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement, păsări de colivie

1. NUMELE SI ADRESA DETINATORULUI AVIZULUI DE COMERCIALIZARE SI A DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE FABRICATIE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACA SUNT DIFERITE

S.C. VANELLI S.R.L.
Str Iasi-Tg-Frumos, km. 10
Letcani, 707280-RO
Tel.: +40 232 253 442
Fax: +40232 253 456
e-mail: office@vanellivet.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

LEVANMIZOL WSP, 100 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori și de agrement, păsări de colivie

Levamisol HCl

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 g pulbere conține:

Substanța activă:

Levamisol HCl 100 mg

Excipienti: glucoza monohidrat

4. INDICATIE (INDICATII)

În tratamentul nematodozelor gastrointestinale și pulmonare produse de stadiile mature și imature ale *Ascaridia spp.*, *Capillaria spp.*, *Syngamus tracheae*, la porumbei voiajori și de agrement, păsări de colivie.

5. CONTRAINDICATII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienti.

Nu se utilizează la porumbeii destinați consumului uman.

6. REACȚII ADVERSE

Rar pot apărea semne de excitabilitate nervoasă (ușor tremor muscular), hipersalivație, vomă, reducerea apetitului sau fecale moi.





Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Porumbei voiajori și de agrement, păsări de colivie

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CAI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează pe cale orală, în apa de baut, astfel:

- porumbei voiajori și de agrement, păsări de colivie: 8 g produs în 2 litri apă de baut, o singură zi.

În cazuri severe, tratamentul durează 2 zile consecutive.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pe perioada tratamentului se administrează numai apa medicamentată. Adăpătorile trebuie igienizate și păstrate curate.

10. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUTII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se depozita la o temperatură sub 25°C.

A se depozita într-un loc uscat.

A se feri de acțiunea directă a razelor solare.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

A nu se utiliza acest produs medicinal veterinar după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONARI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precautii speciale care trebuie luate de către persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la levamisol trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

Pentru a preveni orice efecte neplăcute, la administrarea produsului medicinal veterinar se recomandă purtarea mănușilor de protecție. În caz de contact accidental, spălați bine cu apă, zona contaminată.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii, adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta.

Utilizarea în perioada de ouat

Utilizarea levamisolului în doze terapeutice nu are efecte asupra fertilității și capacității de eclozare a ouălor.

O reducere nesemnificativă a numărului de ouă poate apărea între ziua 2 și 4 post tratament, ca rezultat al discontinuității aprovizionării cu apă peste noapte și în consecință nu are legătură cu administrarea produsului medicinal veterinar.

Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare și alte forme de interacțiune

Împreună de 14 zile înainte și după tratamentul cu levamisol, pasările nu trebuie tratate cu compuși organofosforici (insecticide, acaricide, antihelmintice).

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot)

Orice depășire a dozei recomandate, poate crește riscul de apariție a reacțiilor adverse, menționate la pct. 6 din acest prospect.

A se evita supradozarea.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CARORA A FOST APROBATA ULTIMA DATA PROSPECTUL


Mai 2019

15. Alte informații

Dimensiuni de ambalaj:

Flacon din HDPE cu capac din LDPE, prevăzut cu sigiliu, de 50 g.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului avizului de comercializare.



**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE
AMBALAJ PRIMAR**

Flacon din HDPE x 50 g

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

LEVANMIZOL WSP, 100 mg/g, pulbere pentru administrare în apa de băut la porumbei voiajori si de agrement, păsări de colivie

Levamisol HCl

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Levamisol HCl100 mg/g

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

50 g

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Cale orala, in apa de baut

5. TIMP (TIMPI) DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

6. NUMĂRUL SERIEI

< Serie> < Lot> {număr}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După deschidere se va utiliza în timp de 90 zile.

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.



