

**ANHANG III**

**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton (falls verwendet)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Aquapharm Ringerlactat-Infusionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Natriumchlorid 6,00 mg  
Kaliumchlorid 0,40 mg  
Calciumchlorid 0,204 mg  
(als Dihydrat)  
Natrium-S-Lactat 3,10 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

30 x 250 ml  
20 x 500 ml  
10 x 1000 ml  
4 x 3000 ml  
2 x 5000 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen und Kaninchen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung (Infusion).

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen und nicht verwendetes Tierarzneimittel entsorgen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

250-ml-Beutel: Unter 25 °C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**



**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V511235

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Etiketten (bei Verpackung in einem Karton)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Aqupharm Ringerlactat-Infusionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Natriumchlorid 6,00 mg  
Kaliumchlorid 0,40 mg  
Calciumchlorid 0,204 mg  
(als Dihydrat)  
Natrium-S-Lactat 3,10 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen und Kaninchen.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung (Infusion). Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen und nicht verwendetes Tierarzneimittel entsorgen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

250-ml-Beutel: Unter 25 °C lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**



**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Etiketten (für einzelne Beutel)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Aquapharm Ringerlactat-Infusionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Natriumchlorid 6,00 mg  
Kaliumchlorid 0,40 mg  
Calciumchlorid 0,204 mg  
(als Dihydrat)  
Natrium-S-Lactat 3,10 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

250 ml  
500 ml  
1000 ml  
3000 ml  
5000 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen und Kaninchen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung (Infusion).

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen und nicht verwendetes Tierarzneimittel entsorgen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

250-ml-Beutel: Unter 25 °C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON  
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**



**14. ZULASSUNGSNRUMMERN**

BE-V511235

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}