

**ANGABEN DIREKT AUF DEM INNENBEHÄLTNIS: Sack-Beschriftung**

Pulmotil G 200 ist verpackt in:

1. Säcken aus Polyethylen/Polyamid/Polyethylen (Innenschicht) mit 10 kg des Produktes, oder
2. vorgeformten 1-kg-Säcken aus Laminat (Papier/Polyethylen/Aluminium/Polyethylen/Papier) mit festem Boden; entweder per Naht oder Wärmeversiegelung verschlossen.

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Pulmotil G 200 g/kg Arzneimittel-Vormischung zur Herstellung von Fütterungsarzneimitteln für Schweine und Kaninchen  
Tilmicosin

**2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:**  
Tilmicosin (als Phosphat) 200 g/kg

**3. DARREICHUNGSFORM**

Arzneimittel-Vormischung zur Herstellung von Fütterungsarzneimitteln

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 kg und 10 kg

**5. ZIELTIERART(EN)**

Schweine  
Kaninchen

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Schweine: Therapie und Metaphylaxe von Atemwegserkrankungen, verursacht durch *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* und andere Organismen, die gegenüber Tilmicosin empfindlich sind.

Kaninchen: Therapie und Metaphylaxe von Atemwegserkrankungen, verursacht durch *Pasteurella multocida* und *Bordetella bronchiseptica*, die gegenüber Tilmicosin empfindlich sind.

**7. ART DER ANWENDUNG**

Anwendung nur nach Vermischen mit dem Futter laut Mischanweisung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

**Schweine:** Über einen Zeitraum von 15-21 Tagen wird eine Dosis von 8 bis 16 mg Tilmicosin/kg Körpergewicht/Tag unter das Futter gemischt (ergibt 200 bis 400 ppm im Futter).

**Kaninchen:** Über einen Zeitraum von 7 Tagen wird eine Dosis von 12,5 mg Tilmicosin/kg Körpergewicht/Tag unter das Futter gemischt (ergibt 200 ppm im Futter).

Darf nicht bentonithaltigem Futter beigemischt werden.

Um eine gründliche Verteilung des Produkts zu gewährleisten, sollte es vor der Einmischung in das endgültige Futter zunächst mit einer geeigneten Menge Futter (20 – 50 kg) vorgemischt werden.

Das Produkt kann in pelletiertes Futter eingearbeitet werden, wenn die Dauer der Präkonditionierung möglichst gering ist und die Temperatur 75 ° C nicht überschreitet.

#### **8. WARTEZEITEN**

Schweine	Essbare Gewebe:	21 Tage
Kaninchen	Essbare Gewebe:	4 Tage

#### **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Pferde oder andere Equiden sollten keinen Zugang zu Tilmicosin enthaltendem Futter haben.

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Tilmicosin sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Bei der Handhabung des Tierarzneimittels ist direkter Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten zu vermeiden. Der Anwender sollte eine Schutzausrüstung tragen.

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und diese Kennzeichnung vorzuzeigen.

#### **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen innerhalb von 3 Monaten verwenden.

Nach Einmischen in mehliges oder pelletiertes Futter innerhalb von 3 Monaten verwenden.

#### **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Trocken lagern.

Nicht über 25 °C lagern.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

#### **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Die Gülle behandelter Tiere sollte nicht in aufeinander folgenden Jahren auf demselben Feld ausgebracht werden.

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ERFORDERLICH**

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig

Die Vorschriften über das Einmischen von Arzneimittel-Vormischungen in Fertigfutter sind zu befolgen.

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven  
Deutschland

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

8-70042

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.