

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EQUIDOR 10 mg/ml Injektionslösung für Pferde
Detomidinhydrochlorid

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:
10 mg Detomidinhydrochlorid (entsprechend 8,36 mg Detomidin) und
1 mg Methyl-4-hydroxybenzoat als Konservierungsmittel.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml
15 ml

5. ZIELTIERART(N)

Pferd.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Sedierung und leichten Analgesie bei Pferden.

7. ART DER ANWENDUNG

Ausschließlich zur LANGSAMEN intravenösen Injektion.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 2 Tage.
Milch: 12 Stunden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Es ist darauf zu achten eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Bei versehentlicher Selbstinjektion ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen. Die betroffene Person darf KEIN FAHRZEUG LENKEN, da Sedierung und Blutdruckveränderungen eintreten können.

Spritzer sind von Haut und Augen abzuwaschen. Bei Handhabung des Tierarzneimittels durch schwangere Frauen oder Frauen im gebärfähigen Alter ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Alpha-2-adrenoceptor Agonisten können schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen. Lesen Sie vor der Anwendung die vollständigen Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender in der Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}
Haltbarkeit nach der ersten Entnahme: 28 Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Trocken lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Vetcare Limited
PO Box 99
24101 Salo, Finnland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr. 8-00731

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche 10 ml, 15 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

EQUIDOR 10 mg/ml Injektionslösung für Pferde

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Detomidinhydrochlorid 10 mg/ml (entsprechend Detomidin 8,36 mg/ml)
Methyl-4-hydroxybenzoat 1 mg/ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 ml
15 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intravenösen Injektion.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:
Essbare Gewebe: 2 Tage.
Milch: 12 Stunden.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verw. bis {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen verwendbar bis

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.