

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton für Durchstechflaschen aus LDPE und Glas****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Defixopzyl 200 mg/ml  
Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält:  
Eisen(III)-Hydroxid-Dextran (Komplex) entsprechend Eisen 200 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

Durchstechflaschen aus LDPE und Glas: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml,  
20 x 100 ml und 48 x 100 ml  
LDPE: 1 x 200 ml, 5 x 200 ml und 12 x 200 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Schwein (Ferkel) und Rind (Kalb)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

-

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen und bei unter 25 °C lagern.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30 °C lagern. Die Aluminiumfolie nicht vor der Verwendung der LDPE-Durchstechflasche öffnen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Pharmacosmos A/S

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V661891 (Durchstechflaschen aus Klarglas Typ II)

BE-V661892 (LDPE-Durchstechflaschen)

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot:

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Aluminiumfolienbeutel für LDPE (faltbare Durchstechflasche aus Kunststoff)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Defixopzyl 200 mg/ml  
Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält:  
Eisen(III)-Hydroxid-Dextran (Komplex) entsprechend Eisen 200 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Schwein (Ferkel) und Rind (Kalb).

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen und bei unter 25 °C lagern.  
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis \_\_ / \_\_ / \_\_ /

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30 °C lagern.  
Die Aluminiumfolie nicht vor der Verwendung der LDPE-Durchstechflasche öffnen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Pharmacosmos A/S

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot:

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Durchstechflaschen aus LDPE und Glas****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Defixopzyl 200 mg/ml  
Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält:  
Eisen(III)-Hydroxid-Dextran (Komplex) entsprechend Eisen 200 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Schwein (Ferkel) und Rind (Kalb).

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen und bei unter 25 °C lagern.  
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis \_\_/\_\_/\_\_/

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30 °C lagern.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Pharmacosmos A/S

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: