

B. PACKUNGSBEILAGE

PACKUNGSBEILAGE

DOXYBACTIN VET 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Suspension

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber:

Alfasan Nederland
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nederland

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Beltapharm
Via Stelvio 66
I-20095 Cusano Milanino (MI)
Italien

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonkveer
Niederlande

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Doxybactin Vet 10mg/ml, Tropfen zum Einnehmen, Suspension

Doxycyclin.

3. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Doxycyclini hyclas (= doxycyclinum 10 mg) 11,547 mg - calcii chloridum hexahydricum - Sorbitolum liquid cristallisabile - Aluminium magnesi silicas - Povidonum - Glycerolum - Butylis parahydroxybenzoas - Propylis hydroxybenzoas - Saccharinum natricum - Natrii metabisulfis - Raspberry flavor - Appeline - Natrii hydroxydum - Simeticonum emulsio - Aqua purificata ad 1 ml - Nitrogen q.s.

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Doxybactin Vet ist angezeigt bei Hunden und Katzen zur Behandlung von Krankheiten, die durch doxycyclinempfindliche Erreger verursacht werden.

5. GEGENANZEIGEN

Doxybactin Vet ist nicht angezeigt bei Tieren, die in der Vergangenheit überempfindlich auf Tetracycline reagierten.

6. NEBENWIRKUNGEN

Bei Hunden und Katzen kann es nach Verabreichung starker Dosen im Nüchternzustand zu Erbrechen kommen.

Gastrointestinale Nebenwirkungen sind selten. Unerwünschte Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Diarrhöe können jedoch auftreten.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERARTEN

Hunden und Katzen

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Doxybactin Vet ist für die orale Anwendung bei Hunden und Katzen bestimmt.

Doxybactin Vet ist Hunden und Katzen in folgenden Dosen zu verabreichen :
5 mg/kg Lebendgewicht (oder 0,5 ml/kg) während 5 Tagen.

Zur Beibehaltung und Gewährleistung stabilerer Plasmakonzentrationen ist eine fraktionierte Verabreichung (zweimal täglich) angezeigt.

Bei Verabfolgung ist die Flasche vor Entnahme der therapeutischen Dosis zu schütteln.

Die Resorption von Doxycyclin wird durch die gleichzeitige Aufnahme von Milch oder Nahrung nicht beeinträchtigt. Es kann daher unabhängig von der Nahrungsaufnahme verabreicht werden.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**10. WARTEZEIT****11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für von Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur aufbewahrt, behalten die oralen Tropfen ihre Wirksamkeit bis zum Datum auf der Verpackung.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nach EXP nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Die Gabe von Antibiotika kann gelegentlich eine Vermehrung unempfindlicher Mikroorganismen begünstigen. Das Tier ist daher unter ständiger Beobachtung zu halten.

In Falle einer Magenreizung empfiehlt es sich, Doxybactin Vet mit der Nahrung zu verabreichen.

Die Anwendung von Medikamenten der Tetracyclingruppe während der Zahnentwicklung kann bei Langzeittherapie eine (gelbe) Zahnverfärbung bewirken.

ANWENDUNG WÄHREND DER TRAGZEIT

Doxycyclin wurde nicht bei der trächtigen Hündin und Katze geprüft und sollte diesen Tieren daher nur dann verabreicht werden, wenn es sich nach Ermessen des Tierarztes als unerlässlich für die Bewahrung der Gesundheit des Tieres erweist.

MEDIKAMENTÖSE WECHSELWIRKUNGEN

Antacida, die Aluminium-, Calcium- oder Magnesiumsalze enthalten, verringern die Resorption von Doxycyclin und sind daher bei mit Doxybactin Vet behandelten Tieren kontraindiziert.

NOTBEHANDLUNG

Bei Auftreten von Veränderungen allergischer Art, die auf eine Überempfindlichkeit gegenüber Tetracyclinen zurückzuführen sind, ist die laufende Behandlung sofort zu unterbrechen und eine geeignete symptomatische Therapie einzuleiten.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

August 2021

15. WEITERE ANGABEN

VERPACKUNGEN

Flaschen von 10 ml und 30 ml mit Tropfenzähler graduiert auf 0,25 ml, 0,5 ml und 1 ml. Strichteilung erleichtert die Verabreichung der Dosis, die je nach Gewicht des zu behandelnden Tieres angezeigt ist.

Flaschen von 60 ml mit Spritze graduiert auf 2,5 ml.

VERSCHREIBUNGSSTATUS

Auf tierärztliche Verordnung.

ZULASSUNGSNUMMER

BE-V136394

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.