

KENNZEICHNUNG

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>
<ANGABEN AUF DEM BEÄLTNIS>

Flasche aus braunem Glas

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

BAXYL Long Acting® Oxytetracyclinum 20%, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Oxytetracyclinum dihydricum 216 mg (= 200 mg oxytetracyclinum) – natrii formaldehydsulfoxylas – magnesii oxydum – dimethylacetamidum – dinatrii edetas – ethanolaminum – aqua ad iniectabile q.s. ad 1 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung i.m.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 oder 250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schweine

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Behandlung von Infektionen, die durch Oxytetracyclin empfindliche Keime hervorgerufen werden und die mit einer Ausbreitung von Antibiotika in wirksamer Konzentration im Infektionsherd im Rahmen der pharmakokinetischen Eigenschaften vereinbar sind.

7. ART DER ANWENDUNG

Injektionslösung zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

8. WARTEZEIT

Rinder: Essbare Gewebe : 35 Tage .
Schweine :Essbare Gewebe : 14 Tage
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist..

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Für den Verbraucher :

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Dieses Präparat enthält das Antibiotika Oxytetracyclin. Im Fall einer versehentlichen Selbstinjizierung, selbst von geringen Mengen, konsultieren Sie unverzüglich einen Arzt und zeigen Sie ihm die Gebrauchsanweisung.

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Oxytetracyclin sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden

Für den Arzt :

Keine.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unter 25° C, in der gut verschlossenen Originalverpackung und vor Licht geschützt aufbewahren.

Haltbarkeitsdauer des Tierarzneimittels nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELEN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den lokalen Vorschriften zu entsorgen

Die angemessenen Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen werden, damit das Präparat nicht in die Umwelt gelangt.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

für Tiere

Verschreibungspflichtig durch den Tierarzt.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden, 39c
B-4731 EYNATTEN

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V137146

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Flasche aus braunem Glas****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****BAXYL Long Acting® Oxytetracyclinum 20%, Injektionslösung****2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE**

Oxytetracyclinum dihydricum 216 mg (= 200 mg oxytetracyclinum) pro ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

100 oder 250 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

i.m. Anwendung.

5. WARTEZEIT

Rinder :Essbare Gewebe: 35 Tage

Schweine :Essbare Gewebe: 14 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist..

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis

Haltbarkeitsdauer des Tierarzneimittels nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

8. VERMERK " FÜR TIERE"

für Tiere

BAXYL_ETIQ_DE_V1_20120926