ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte avec seringues****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****ORBENIN Long Acting**, 200 mg, suspension intramammaire**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES***Cloxacillin. natriicum monohydricum* (= *Cloxacillin*. 200 mg/3g)**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

3, 12 ou 48 Seringues intramammaires

4. ESPÈCES CIBLES

Vaches

5. INDICATIONS

-

6. VOIES D'ADMINISTRATION

L'applicateur Orbenin Long Acting permet l'administration du médicament vétérinaire soit avec un embout long, soit avec un embout court. Utiliser des préférences l'embout court.

Mode d'utilisation de l'embout court:

Casser l'extrémité du capuchon. Insérer seulement l'embout court dans le canal du trayon et injecter en douceur. Eviter absolument de toucher l'embout avec les doigts.

Mode d'utilisation de l'embout long:

Enlever le capuchon en le pliant légèrement à sa base, de sorte à ce qu'il se libère.

Insérer délicatement l'embout dans le canal du trayon et injecter en douceur. Eviter absolument de toucher l'embout avec les doigts.

Dessin explicitant l'utilisation de la seringue avec embout court ou avec embout long.

7. TEMPS D'ATTENTE**Temps d'attente:**

Lait: 120 heures après la dernière administration

Viande et abats: 1 jour

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V080437

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Seringues****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****ORBENIN Long Acting**, 200 mg, suspension intramammaire pour bovins**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES***Cloxacillin. natricum monohydricum* (= *Cloxacillin*. 200 mg/3g)**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}