

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Cepravin Dry Cow 250 mg/3 g zawiesina dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

250 mg cefalonium/tubostrzykawkę dowymieniową

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA



20 tubostrzykawek dowymieniowych
120 tubostrzykawek dowymieniowych



4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia).

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie dowymieniowe.

	1 Po zakończeniu udoju należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować ujście strzyku (np. przy użyciu bawełnianej waty nasączonej spirytusem metylowym).
	2 (i) Opcja 1: Podanie dowymieniowe płytkie - trzymając tubostrzykawkę dowymieniową u podstawy zatyczki jedną ręką, należy ruchem obrotowym usunąć górną część zatyczki znajdującą się ponad rowkiem (dolna część zatyczki pozostaje na tubostrzykawce dowymieniowej). Należy dołożyć starań aby nie zanieczyścić odsłoniętej krótkiej części aplikatora.
	2 (ii) Opcja 2: podanie dowymieniowe głębokie - usunąć zatyczkę całkowicie trzymając mocno tubostrzykawkę dowymieniową w dłoni jednej ręki i naciskając kciukiem w górę wzdłuż linii długiej zatyczki do momentu usłyszenia kliknięcia. Należy dołożyć starań aby nie zanieczyścić aplikatora.

	Wprowadzić końcówkę tubostrzykawki dowymieniowej do kanału strzykowego, stosując stały nacisk na tłok podać całą zawartość tubostrzykawki dowymieniowej. Trzymając strzyk w jednym ręku, delikatnie masować ku górze drugą ręką w celu rozprowadzenia antybiotyku w ćwiartce wymienia.
	Na zakończenie zanurzyć strzyk w środku do higieny strzyków.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 21 dni.

Mleko:

Przy podaniu produktu co najmniej 51 dni przed porodem: 96 godzin od porodu.

Jeśli poród nastąpił wcześniej: 55 dni od daty podania leku.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.

Unikać gwałtownych zmian temperatury w czasie przechowywania.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1091/00

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBOSTRZYKAWKA DOWYMIENIOWA PP

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Cepravin Dry Cow

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

250 mg cefalonium/tubostrzykawkę dowymieniową

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego zużyć natychmiast.