

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Lietot parastās dzīvnieku fiksācijas metodes.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Vakcīna var izraisīt mezgliņa veidošanos injekcijas vietā pēc subkutānas injekcijas.

Vakcinācija reizēm var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas dažiem dzīvniekiem, īpaši tiem, kas jau ir inficēti ar *Erysipelothrix rhusiopathiae*. Tādos gadījumos nekavējoties jāuzsāk atbilstoša ārstēšana.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas un dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības, laktācijas un dēšanas laikā.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par zāļu nekaitīgumu un efektivitāti, ja vakcīnu lieto kopā ar kādu citu vakcīnu. Tāpēc iesaka nelietot citas vakcīnas vismaz 14 dienas pirms vai pēc vakcinācijas ar šo vakcīnu.

4.9 Devas un lietošanas veids

Cūkām:

Dziļai intramuskulārai injekcijai kakla muskuļos vai subkutānai injekcijai.

Injicēt vienu 2 ml devu saskaņā ar sekojošu shēmu:

Plānotiem vaislas dzīvniekiem (jauncūkas un kuilīši) un vaislas dzīvniekiem:

- Primārā vakcinācija:
Divas injekcijas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu pirms pirmās pārošanas.
- Revakcinācija:
Reizi pusgadā.

-Sivēnmātēm: katras laktācijas beigās vai grūsnības pēdējā mēnesī.

-Kuilīiem: ne ātrāk kā 3 nedēļas pirms pārošanas.

Nobarojamās cūkas:

Divas injekcijas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu no 10 nedēļu vecuma.

Grūsnām aitām:

Subkutānai lietošanai.

Injicēt vienu 2 ml devu saskaņā ar sekojošu shēmu:

- Primārā vakcinācija:
Divas injekcijas ar 3 līdz 4 nedēļu intervālu.
- Revakcinācija:
Viena injekcija grūsnības pēdējā trešdaļā.

Tītariem:

Subkutānai lietošanai.

Injicēt vienu 0,5 ml devu saskaņā ar sekojošu shēmu:

- Primārā vakcinācija:
Viena injekcija no 8 nedēļu vecuma.
- Revakcinācija:
Pirms dēšanas sākuma.

Pirms lietošanas saskalināt.

Ievērot aseptiku.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Netika novērotas blakusparādības pēc dubultas vakcīnas devas ievadīšanas.

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5. IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: inaktivētu baktēriju vakcīnas (ieskaitot mikoplazmas, toksoīdus un hlamīdijas).

ATĶ vet kods: QI01CB02, QI04AB08, QI09AB03.

Vakcīna ierosina imunitāti pret *Erysipelothrix rhusiopathiae*, ko uzrāda pārbaudes ar serotipiem 1a, 1b un 2.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Tiomersāls

Nātrijs hlorīds šķīdums

6.2 Būtiska nesaderība

Nelietot maisījumā ar citu vakcīnu vai imunoloģiskām zālēm.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Viens 10 ml (stikla) flakons kartona kastītē.
Viens 20 ml (stikla) flakons kartona kastītē.
Viens 50 ml (stikla) flakons kartona kastītē.
Viens 250 ml (polipropilēna) flakons kartona kastītē.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Boehriner Ingelheim Animal Health France SCS
29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
Francija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/02/1434

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 15/02/2002
Pēdējās pārreģistrācijas datums: 18/08/2008

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

07/2020

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.