

[Versija 9, 2021-10] pataisyta 2022-11

**I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS**

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Apivar, 500 mg, amitrazo avilio juostelės medunešėms bitėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje 15 g juostelėje yra:

veikliosios medžiagos:

amitrazo.....500 mg.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os):

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Etileno vinilacetatas

Stačiakampė permatoma vienalytė standi juostelė su „V“ formos įpjova ir skylute viename gale.

Ant kiekvienos juostelės krašto užrašas „Apivar“.

Juostelės sujungtos po dvi, su perforuota linija atskyrimui.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšis

Medunešės bitės – *Apis mellifera*.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Medunešių bičių varozei, sukeltai amitrazui jautrių *Varroa destructor*, gydyti.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti, kai yra žinomas atsparumas amitrazui.

3.4. Specialieji įspėjimai

Veterinarinį vaistą rekomenduojama naudoti po medunešio, bet ne per medunešį. Žr. punktą „Dozės ir naudojimo būdas“.

Juostelių negalima karpyti.

Visas tame pačiame bityne esančias šeimas reikia gydyti vienu metu, kad būtų išvengta pakartotinio užkrėtimo.

Juostelių negalima naudoti pakartotinai.

Veterinarinio vaisto saugumas ir veiksmingumas buvo tiriamas aviliuose su vienu perų aukštu (2 juostelių dozė vienam aviliui / perų aukštui). Nerekomenduojama naudoti aviliuose, kuriuose yra daugiau nei vienas perų aukštas.

Netinkamai naudojant veterinarinį vaistą gali padidėti atsparumo išsivystymo rizika ir galiausiai gydymas gali būti neveiksmingas.

Bičių šeimas reikia reguliariai stebėti, ar nėra užsikrėtimo varozės erke, ypač prieš gydymą ir tam tikrą laikotarpį po jo.

Veterinarinį vaistą reikia naudoti kaip integruotą varozės kontrolės programos dalį ir gydymo būdus būtina kaitalioti.

Buvo registruotas kai kurių Varroa erkių populiacijų atsparumas amitrazui.

Jei veterinarinis vaistas naudojamas regionuose, kuriuose įtariamas atsparumas amitrazui, rekomenduojama jį naudoti remiantis jautrumo tyrimo rezultatais, taip pat rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Negalima viršyti rekomenduojamos dozės ir rekomenduojamo naudojimo laiko.

Pabaigus gydymą, juosteles reikia išimti.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šio veterinarinio vaisto sudėtyje yra amitrazo, kuris žmonėms gali sukelti neurologinius šalutinio poveikio požymius. Amitrazas yra monoaminooksidazės inhibitorius, todėl žmonės, vartojantys monoamino oksidazės inhibitorius, kraujospūdį mažinančius vaistus ar sergantys diabetu, turi būti ypatingai atsargūs.

Amitrazas gali sukelti odos jautrumą (alerginę reakciją, ypač odos bėrimus).

Vengti sąlyčio su oda. Tuo atveju, jei sąlytis su oda buvo, būtina plauti su muilu ir vandeniu.

Vengti patekimo į akis. Jei taip atsitiko, reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens.

Naudojant veterinarinį vaistą reikia naudoti asmeninės apsaugos priemones, kurias sudaro nepralaidžios pirštinės ir specialus bitininko kostiumas.

Jei atsiranda dirginimas, reikia skubiai kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Naudojant veterinarinį vaistą, negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Naudojant veterinarinį vaistą, vaikai turėtų būti atokiau.

Po naudojimo būtina nusiplauti rankas.

Negalima įkvėpti ar nuryti.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Nemeskite juostelių ar tuščių paketėlių į tvenkinius ar upelius, nes veterinarinis vaistas gali būti pavojingas žuvims ir vandens organizmams.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Medunešės bitės

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	¹ Laikinas elgesio pakitimas
--	---

¹Laikinas elgesio pakitimas (pvz., neramumas, agresyvus elgesys) gali būti pastebimas, kai juostelės pirmą kartą dedamos į avilį. Manoma, kad tai yra gynybinis elgesys, o ne nepalanki reakcija į veterinarinį vaistą.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Netaikytina.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Vario druskos didina toksinį amitrazo poveikį, o piperonilo butoksidas mažina terapinį poveikį. Šias medžiagas reikia vengti naudoti kartu su amitrazu.

Tuo pačiu metu negalima naudoti jokio kito parazitų naikinančio veterinarinio vaisto.


3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudojimas avilyje:

naudoti dvi juosteles aviliui (t. y. 1 g amitrazo aviliui).

1. Perskirti dvigubą juostelę.
2. Išstumti juostelės V formos išpjovą į išorę.
3. Kiekvieną juostelę įdėti tarp dviejų rėmų viršutinių kraštų **perų lizdo ar bičių kamuolio viduje**, tarp juostelių paliekant ne mažesnę kaip 2 rėmus apimančią atstumą. Juostelės turėtų būti dedamos taip, kad bitės galėtų laisvai pasiekti abi puses.

Taip pat juostelės gali būti pakabintos per skylutę V formos išpjovoje perveriant kabliuką, vielutę ar kokią tiesų pagaliuką, kuris turi būti pritvirtintas ant rėmo.



Jei perų nėra arba jų jau labai nedaug, juostelės gali būti pašalintos po 6 gydymo savaitių. Jei yra perų, juosteles reikia laikyti 10 savaitių. Jei juostelės yra padengtos propoliu ir (arba) vašku, apie gydymo laiko vidurį, jas galima atsargiai nuvalyti bitininko kaltu. Tada juostelės vėl turėtų būti dedamos atgal, atsižvelgiant į tai, kur tuo metu yra perų lizdas ar bičių kamuolys.

Gydyti rekomenduojama, kai po paskutinio medunešio nėra medaus atsargų (vėlyvą vasarą / rudenį) ir prieš prasidedant pavasario medaus gamybai. Rekomenduojama stebėti užkrėstumą, kad būtų nustatyta, kada geriausia gydyti.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

6 savaites panaudojus dozes, kurios penkis kartus didesnės už rekomenduojamas, labai karštomis dienomis spietėsi bičių šeimos. Kitų požymių nepastebėta. 10 savaičių panaudojus dozes, kurios 1,5 karto didesnės už rekomenduojamas, matomo šalutinio poveikio bitėms nenustatyta.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

Medui – 0 parų.

Negalima naudoti per medunešį.

Negalima imti medaus iš perų lizdo.

Negalima kopinėti medaus, kai taikomas gydymas.

Koriai, skirti perams, turi būti keičiami ne rečiau kaip kas treji metai. Perams naudotų korių perdirbant negalima sumaišyti su medaus koriais.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas:

QP53AD01.

4.2. Farmakodinamika

Amitrazas yra formamidinų grupės akaricidas, pasižymintis agonistiniu poveikiu oktopamino receptoriams ir erkėms sukeliantis stiprią oktopaminerginių sinapsių stimuliaciją, dėl kurios atsiranda drebulys, traukuliai, parazitas atsikabina ir žūsta.

4.3. Farmakokinetika

Amitrazas išsiskiria juostelių paviršiuje ir veikia per sąlytį su bitėmis. Amitrazo farmakokinetika bitės organizme nežinoma.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant, o nesunaudotą veterinarinį vaistą išmesti.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti originalioje pakuotėje

Laikyti sandariai uždarytą pakuotę.

Saugoti nuo šviesos.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Karštu būdu užlydytas daugiasluoksnis paketėlis, pagamintas iš dviejų sluoksnių: PE/PA/Alu/PET ir PE/Alu/oPA

Pakuotės dydžiai:

4 juostelių.

10 juostelių.

12 juostelių.

60 juostelių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Šis veterinarinis vaistinis neturi patekti į vandens telkinius, kadangi amitrazas gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

VETO PHARMA SAS

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2418/001-004

8. REGISTRAVIMO DATA

2017-09-22

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-02-26

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama be veterinarinio recepto.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

{JUOSTELIŲ PAKETĖLIS}

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Apivar, 500 mg, amitrazo avilio juostelės medunešėms bitėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvienoje 15 g juostelėje yra:
amitrazo.....500 mg.

3. PAKUOTĖS DYDIS

4 juostelių.
10 juostelių.
12 juostelių.
60 juostelių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Medunešės bitės – *Apis mellifera*.

5. INDIKACIJA (-OS)

Medunešių bičių varozei, sukeltai amitrazui jautrių *Varroa destructor*, gydyti.

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti avilyje.

7. IŠLAUKA

Medus: 0 parų.
Negalima naudoti per medunešį.
Negalima imti medaus iš perų lizdo.
Negalima kopinėti medaus, kai taikomas gydymas.
Koriai, skirti perams, turi būti keičiami ne rečiau kaip kas treji metai. Perams naudotų korių perdirbant negalima sumaišyti su medaus koriais.

8. TINKAMUMO DATA

Tinka iki mm/YYYY
Atidarę sunaudokite nedelsiant.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Laikyti originalioje pakuotėje
Laikyti sandariai uždarytą pakuotę.
Saugoti nuo šviesos.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“
--

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“
--

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

VETO PHARMA SAS

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2418/001
LT/2/17/2418/002
LT/2/17/2418/003
LT/2/17/2418/004

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Apivar, 500 mg, amitrazo avilio juostelės medunešėms bitėms

2. Sudėtis

Kiekvienoje 15 g juostelėje yra:
veikliosios medžiagos:
amitrazo.....500 mg.

Stačiakampė permatoma vienalytė standi juostelė su „V“ formos įpjova ir skylute viename gale.
Ant kiekvienos juostelės krašto užrašas „Apivar“.
Juostelės sujungtos po dvi, su perforuota linija atskyrimui.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Medunešės bitės – *Apis mellifera*.

4. Naudojimo indikacijos

Medunešių bičių varozei, sukeltai amitrazui jautrių *Varroa destructor*, gydyti.

5. Kontraindikacijos

Negalima naudoti, kai yra žinomas atsparumas amitrazui.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Veterinarinį vaistą rekomenduojama naudoti po medunešio, bet ne per medunešį. Žr. punktą „Dozės ir naudojimo būdas“.

Juostelių negalima karchyti.

Visas tame pačiame bityne esančias šeimas reikia gydyti vienu metu, kad būtų išvengta pakartotinio užkrėtimo.

Juostelių negalima naudoti pakartotinai.

Veterinarinio vaisto saugumas ir veiksmingumas buvo tiriamas aviliuose su vienu perų aukštu (2 juostelių dozė vienam perų aukštui). Nerekomenduojama naudoti aviliuose, kuriuose yra daugiau nei vienas perų aukštas.

Netinkamai naudojant veterinarinį vaistą gali padidėti atsparumo išsivystymo rizika ir galiausiai gydymas gali būti neveiksmingas.

Bičių šeimas reikia reguliariai stebėti, ar nėra užsikrėtimo varozės erke, ypač prieš gydymą ir tam tikrą laikotarpį po jo.

Veterinarinį vaistą reikia naudoti kaip integruotą varozės kontrolės programos dalį ir gydymo būdus būtina kaitalioti.

Buvo registruotas kai kurių *Varroa* erkių populiacijų atsparumas amitrazui.

Jei veterinarinis vaistas naudojamas regionuose, kuriuose įtariamas atsparumas amitrazui, rekomenduojama jį naudoti remiantis jautrumo tyrimo rezultatais, taip pat rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams:

Negalima viršyti rekomenduojamos dozės ir rekomenduojamo naudojimo laiko.

Pabaigus gydymą, juosteles reikia išimti.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šio veterinarinio vaisto sudėtyje yra amitrazo, kuris žmonėms gali sukelti neurologinius šalutinio poveikio požymius. Amitrazas yra monoaminooksidazės inhibitorius, todėl žmonės, vartojantys monoamino oksidazės inhibitorius, kraujospūdį mažinančius vaistus ar sergantys diabetu, turi būti ypatingai atsargūs.

Amitrazas gali sukelti odos jautrumą (alerginę reakciją, ypač odos bėrimus).

Vengti sąlyčio su oda. Tuo atveju, jei sąlytis su oda buvo, būtina plauti su muilu ir vandeniu.

Vengti patekimo į akis. Jei taip atsitiko, reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens.

Naudojant veterinarinį vaistą, reikia naudoti asmeninės apsaugos priemones, kurias sudaro nepralaidžios pirštinės ir specialus bitininko kostiumas.

Jei atsiranda dirginimas, reikia skubiai kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinę lapelį ar etiketę.

Naudojant veterinarinį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Naudojant veterinarinį vaistą, vaikai turėtų būti atokiau.

Po naudojimo būtina nusiplauti rankas.

Negalima įkvėpti ar nuryti.

Specialiosios aplinkos apsaugos priemonės

Nemeskite juostelių ar tuščių paketėlių į tvenkinius ar upelius, nes veterinarinis vaistas gali būti pavojingas žuvims ir vandens organizmams.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Vario druskos didina toksiinį amitrazo poveikį, o piperonilo butoksidas mažina terapinį poveikį. Šias medžiagas reikia vengti naudoti kartu su amitrazu.

Tuo pačiu metu negalima naudoti jokio kito parazitų naikinančio veterinarinio vaisto.

Perdozavimas

6 savaites panaudojus dozes, kurios penkis kartus didesnės už rekomenduojamas, labai karštomis dienomis spietėsi bičių šeimos.

Kitų požymių nepastebėta. 10 savačių panaudojus dozes, kurios 1,5 karto didesnės už rekomenduojamas, matomo šalutinio poveikio bitėms nenustatyta.

Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos:

Nežinomi.

Pagrindiniai nesuderinamumai:

Nežinomi.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Medunešės bitės.

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	¹ Laikinas elgesio pakitimas
--	---

¹Laikinas elgesio pakitimas (pvz., neramumas, agresyvus elgesys) gali būti pastebimas, kai juostelės pirmą kartą dedamos į avilį. Manoma, kad tai yra gynybinis elgesys, o ne nepalanki reakcija į veterinarinį vaistą.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokiais nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui <arba registruotojo vietiniam atstovui> naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>


8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Naudojimas avilyje:

naudoti dvi juosteles aviliui (t. y. 1 g amitrazo aviliui).

1. Perskirti dvigubą juostelę.
2. Išstumti juostelės V formos išpjovą į išorę.
3. Kiekvieną juostelę įdėti tarp dviejų rėmų viršutinių kraštų **perų lizdo ar bičių kamuolio viduje**, tarp juostelių paliekant ne mažesnę kaip 2 rėmų apimančią atstumą. Juostelės turėtų būti dedamos taip, kad bitės galėtų laisvai pasiekti abi puses.

Taip pat juostelės gali būti pakabintos per skylutę ar V formos išpjovoje perveriant kabliuką, vielutę ar kokį tiesų pagaliuką, kuris turi būti pritvirtintas ant rėmo.



Jei perų nėra arba jų jau labai nedaug, juostelės gali būti pašalintos po 6 gydymo savaitių. Jei yra perų, juosteles reikia laikyti 10 savaitių. Jei juostelės yra padengtos propoliu ir (arba) vašku, apie gydymo laiko vidurį, jas galima atsargiai nuvalyti bitininko kaltu. Tada juostelės vėl turėtų būti dedamos atgal, atsižvelgiant į tai, kur tuo metu yra perų lizdas ar bičių kamuolys.

Gydyti rekomenduojama, kai po paskutinio medunešio nėra medaus atsargų (vėlyvą vasarą / rudenį) ir prieš prasidedant pavasario medaus gamybai. Rekomenduojama stebėti užkrėstumą, kad būtų nustatyta, kada geriausia gydyti.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Nėra.

10. Išlauka

Medui – 0 parų.

Negalima naudoti per medunešį.

Negalima imti medaus iš perų lizdo.

Negalima kopinėti medaus, kai taikomas gydymas.

Koriai, skirti perams, turi būti keičiami ne rečiau kaip kas treji metai. Perams naudotų korių perdirbant negalima sumaišyti su medaus koriais.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje..

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Laikyti originalioje pakuotėje.

Laikyti sandariai uždarytą pakuotę.

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant, o nesunaudotą veterinarinį vaistą išmesti.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją <ar su buitinėmis atliekomis>.

Šis veterinarinis vaistas neturi patekti į vandens telkinius, kadangi amitrazas gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama be veterinarinio recepto.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/17/2418/001

LT/2/17/2418/002

LT/2/17/2418/003

LT/2/17/2418/004

Pakuotės dydžiai:

4 juostelių.

10 juostelių.

12 juostelių.

60 juostelių.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2025-02-26

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas:

VETO-PHARMA SAS
12-14 rue de la Croix Martre
91120 Palaiseau
PRANCŪZIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

VETO-PHARMA
ZA Champrue
36310 Chaillac
PRANCŪZIJA

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas:
Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

BICIU AUSTEJA LTD
Saltupio str. 24Anyksciai LT29109 Lithuania
LT 29132 Lithuania Anykščiai
Tel: +37069918861