

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Procal Inj. инжекционен разтвор за говеда, коне, телета, кончета, овце, кози, прасета, прасенца, кучета, котки и зайци

2. Състав

Calcium gluconate 350 mg/ml
Calcium glucoheptonate 100 mg/ml

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда, коне, телета, кончета, овце, кози, прасета, прасенца, кучета, котки и зайци.

4. Показания за употреба

Procal Inj. е показан за употреба, като помощно средство при лечение на състояния на хипокалцемия, като млечна треска и следродилна пареза при говеда и тетания при кучета и котки. Предпазване и лечение на калциев дефицит при говеда, коне, телета, кончета, овце, кози, прасета, прасенца, кучета, котки и зайци.

5. Противопоказания

Да не се използва при животни със сърдечни увреждания, като аритмия и атриални фибрилации.

6. Специални предупреждения

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Предозиране:

Продуктът е предназначен за лечение на остър дефицит при животозастрашаващо състояние и предозиране в препоръчаните дози е малко вероятно.

7. Неблагоприятни реакции

Говеда, коне, телета, кончета, овце, кози, прасета, прасенца, кучета, котки и зайци:

Неопределена честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):	Болка в мястото на инжектиране*, Крамп NOS (мускулни)*
---	---

*В случай на интрамускулното приложение.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За подкожно, интрамускулно и много бавно интравенозно приложение.

Уверете се, че съдържанието на флакона е със същата температура като телесната на животното, което ще бъде третирано.

Говеда: 100 ml

Коне: 50 - 100 ml

Телета, кончета, овце, кози: 20 - 30 ml

Прасета: 10 - 15 ml

Прасенца (подкожно): 1 - 2 ml

Кучета: 2 - 10 ml

Котки, зайци: 1 - 2 ml

При необходимост, повторно третиране след 4 - 8 часа или по препоръка на лекуващия ветеринарен лекар.

Проверявайте сърдечната функция при интравенозно приложение.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Продуктът трябва да се прилага с повишено внимание, особено при едновременно наличие на токсемия.

Преди употреба затоплете продукта до телесна температура.

При подкожно приложение, масажирайте мястото на инжектиране.

При интравенозно приложение, особено внимание трябва да се обърне на бавното въвеждане.

Поради причината, че интравенозното приложение може да предизвика смърт, този начин на приложение, трябва да се използва само от ветеринарен лекар. Трябва да се извърши преценка на сърдечната функция по време и непосредствено след интравенозно приложение на продукта. При възникване на неблагоприятни реакции, интравенозно приложение трябва да бъде прекратено незабавно.

Дозата да се прилага разделена в различни места на инжектиране, като при подкожно приложение се инжектират до 5 ml в едно място на инжектиране, а при интрамускулно до 10 ml в едно място на инжектиране.

10. Карентни срокове

Месо и вътрешни органи: нула дни.

Мляко: нула дни.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Остатъкът във флакона след изтегляне на определено количество не трябва да се използва.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-1877

Тип II стъклени флакони от 100 ml със стерилна тип I гумена запушалка и алуминиева капачка, опаковани в индивидуални картонени кутии.

15. Дата на последната редакция на текста

10/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

Kepto B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Холандия

Телефон: + 31 (0) 570 66 29 00
Електронна поща: info@kepto.nl

Дистрибутор и местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Възраждане-Касис ООД,
Тел.: 068604111

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП