

ANHANG I
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Pappschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

DOFATRIM-JECT, 40 mg – 200 mg, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Trimethoprim 40 mg/ml
Sulfadoxin 200 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml
250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schweine.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Für intramuskuläre, subkutane oder intravenöse Anwendung für Rinder und Schweine.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 8 Tage.

Milch: 2 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp.

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dopharma Research B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V215555

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Braunglas-Injektionsflaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

DOFATRIM-JECT, 40 mg – 200 mg, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Trimethoprim 40 mg/ml
Sulfadoxin 200 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schweine.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Für intramuskuläre, subkutane oder intravenöse Anwendung für Rinder und Schweine.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 8 Tage.

Milch: 2 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp.

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dopharma Research B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot