

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton

1 x 4 ml Durchstechflasche
10 x 4 ml Durchstechflaschen
1 x 10 ml Durchstechflasche
5 x 10 ml Durchstechflaschen
1 x 20 ml Durchstechflasche
1 x 100 ml Injektionsbeutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dalmarelin, 25 Mikrogramm/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält: Lecirelin 25,0 µg (als Lecirelinacetat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 4 ml
10 x 4 ml
1 x 10 ml
5 x 10 ml
1 x 20 ml
1 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh), Kaninchen

5. ANWENDUNGSGEBIETE

-

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:
Essbare Gewebe: Null Tage.
Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage
Nach Anbrechen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

FATRO S.p.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

8-00606

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett

100 ml Injektionsbeutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dalmarelin, 25 Mikrogramm/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält: Lecirelin 25,0 µg (als Lecirelinacetat)

3. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh), Kaninchen

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:
Essbare Gewebe: Null Tage.
Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage
Nach Anbrechen verwendbar bis:

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

FATRO S.p.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett

4 ml Durchstechflasche, 10 ml Durchstechflasche, 20 ml Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dalmarelin

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Lecirelin 25 µg/ml (als Lecirelinacetat)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage

Nach Anbrechen verwendbar bis: