

GEBRAUCHSINFORMATION
VANGUARD CPV, Injektionssuspension für Hunde

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B-1348 Louvain-la-Neuve

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

VANGUARD CPV, Injektionssuspension für Hunde

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Dosis (1 ml) Vanguard CPV enthält:

- Lebend attenuiertes Parvovirus (CPV), Stamm NL-35-D, *low passage*: min. $10^{7,0}$ GKID₅₀*

* Gewebekulturinfektiöse Dosen 50%

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Aktive Immunisierung von Hunden zur Reduzierung der klinischen Anzeichen der vom Erreger CPV (Type 2a, 2b und 2c) ausgelösten Krankheiten.

Der Beginn der Immunität ist 7 Tage nach der ersten Impfung.

Die Immunität gegen das Canine Parvovirus hält - wie von der Serologie empfohlen - mindestens 12 Monate an.

5. GEGENANZEIGEN

Hunde nicht in schlechtem Gesundheitszustand impfen.

6. NEBENWIRKUNGEN

- Nach gleichzeitiger oder gemischter Gabe von Versiguard Rabies und Vanguard für Hunde können bis zu 4 Stunden nach dem Impfvorgang bei geimpften Hunden eine vorübergehende Schwellung (von bis zu 6 cm) an der Injektionsstelle sowie eine vorübergehende Schwellung der submandibulären und/oder präskapulären Lymphknoten an der Injektionsstelle auftreten. Diese Symptome klingen innerhalb von 24 Stunden ab.

- Bei geimpften Hunden kann 4 bis 6 Stunden nach der Impfung eine vorübergehende Schwellung auftreten. Diese verschwindet normalerweise nach rund 7 Tagen wieder. Gelegentlich kann die

Schwellung schmerzhaft sein und bis zu 8 Tagen nach der Impfung andauern. Eine vorübergehende Hyperthermie ist ebenfalls möglich.

- Unter außergewöhnlichen Umständen kann es zu einer allergischen Reaktion kommen, für die dann eine geeignete symptomatische Behandlung mit Antihistaminen, Entzündungshemmern und/oder Epinephrin erforderlich ist.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermaßen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen während der Behandlung)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichte).>

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Hunden

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Dosierung und Art der Anwendung:

1 ml subkutan injizieren.

Impfschema

Erstimpfung :

- *Tiere unter 12 Wochen:*

Zwei Dosen Vanguard CPV in mindestens 14 Tage Abstand. Die erste Dosis kann ab dem Alter von 6 Wochen verabreicht werden. Die zweite Gabe muss erfolgen, wenn das Tier mindestens 12 Wochen alt ist.

- *Tiere ab der 12. Lebenswoche:*

Eine Einmaldosis Vanguard CPV.

Wiederholungsimpfung:

Eine jährliche Auffrischungsimpfung mit einer Einmaldosis Impfstoff wird empfohlen.

Gemeinsame Verabreichung mit Versiguard Rabies

Vor dem Mischen beider Produkte sind die Vanguard Impfstoffe gemäß ihrer jeweiligen SPC zu rekonstituieren. Die rekonstituierte Ampulle wird gut geschüttelt und dann mit 1 ml Versiguard Rabies vermischt, entweder in der Versiguard Rabies Ampulle oder in einer Spritze. Versiguard Rabies wird vor Gebrauch gut geschüttelt. Die vermischten Impfstoffe werden leicht geschüttelt und dann unmittelbar subkutan injiziert.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Wie bei allen CPV-Impfstoffen kann sich der hohe Gehalt an Antikörpern mütterlichen Ursprungs auf die Reaktion auf den CPV-Anteil auswirken. Hier kann eine zusätzliche Impfung mit Vanguard CPV zwischen der ersten und der zweiten Dosis Vanguard CPV bei Welpen vorgenommen werden, die einem besonderen Risiko einer Infektion durch den Caninen Parvovirus ausgesetzt sind.

10. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C). Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.

Die Haltbarkeitsdauer gilt nur für Impfstoffe, die bei vorgenannten Temperaturen gelagert werden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

- Unter außergewöhnlichen Umständen kann es zu einer allergischen Reaktion kommen, für die dann eine geeignete symptomatische Behandlung mit Antihistaminen, Entzündungshemmern und/oder Epinephrin erforderlich ist.
- Im Falle einer versehentlichen Selbstinjektion unverzüglich mit Wasser waschen. Sollten Symptome andauern, einen Arzt aufsuchen und eine Kopie des Beipackzettels vorlegen.
- Die Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation wird nicht empfohlen.
- Untersuchungen der immunologischen Wechselwirkungen ergaben, daß Vanguard CPV gleichzeitig mit dem Impfstoff Vanguard Lepto verabreicht werden kann.
Vanguard CPV kann als flüssige Anteil für dem Fraktion DA2Pi der Vanguard vaccins verabreicht werden.
- Die verfügbaren Daten zu Sicherheit und Wirkung zeigen, dass der Impfstoff Hunden subkutan am gleichen Tag verabreicht werden kann wie Versiguard Rabies, entweder vermischt oder an verschiedenen Injektionsstellen. Zur Immunitätsdauer von Vanguard bei Verwendung mit Versiguard Rabies gibt es keine Angaben.
- Nicht mischen Sie mit jeder anderen Tierarzneimittels außer Versiguard Rabies und/oder die Valenz in Abschnitt 12 aufgeführten.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Februar 2017

15. WEITERE ANGABEN

BE-V161576

Verschreibungspflichtig.