




**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**



## 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

RUVCAC - vaccin viu, atenuat, liofilizat, monovalent, contra rujetului la porcine

## 2. COMPOZITIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 doza contine:

### Substanta activă:

Suspensie *Erysipelothrix rhusiopathiae*, tulipa VR2, atenuată, serotip 2a, minim  $10^{7.0}$  – maxim  $10^{7.5}$  UFC / doza

### Excipienti:

Coloid protector (stabilizator) PDZ 14T în raport ..... 3 : 1

Pentru lista completă a excipientilor vezi secțiunea 6.1.

## 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Vaccin viu liofilizat. Peletă vaccinală liofilizată de culoare alb gălbui.

## 4. PARTICULARITATI CLINICE

### 4.1. Specii țintă

Porcine (tineret porcin, scroafe, scrofite, vieri)

### 4.2. Indicații pentru utilizare cu specificarea speciilor țintă

Se utilizează pentru imunizarea activă a porcilor (tineret porcin, scroafe, scrofite, vieri) în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și/sau leziunilor specifice rujetului, și pentru imunizarea pasivă a progenilor scroafelor și scrofitelor vaccinate, în vederea reducerii mortalității și a semnelor clinice datorate infecției cu *Erysipelothrix rhusiopathiae* pentru primele săptămâni de viață.

Imunitatea se instalează la 21 zile și durează 6 luni.

### 4.3. Contraindicații

Vaccinarea cu Ruvac nu se va face la:

- animale cu boli infectocontagioase, parazitare sau cu deficiențe nutriționale și metabolice
  - scroafele / scrofitele care au peste 100 de zile vîrstă a gestației,
  - tineretul cu varsta sub 90 zile
  - animalele cărora li s-au administrat antibiotice cu 7 zile înainte de vaccinare; Administrarea de antibiotice timp de cel puțin 7 zile după vaccinare.
- De asemenea nu se vor vaccina animalele după transport, lotizări, transfer.

### 4.4. Atenționări speciale

Nu s-au consemnat date privind răspandirea VR2 de la animalele tinta vaccinate la cele nevaccinate în timpul utilizării vaccinului pe specia tinta. De asemenea nu s-au consemnat date privind răspandirea tulpinii la alte specii.

### 4.5. Precauții speciale pentru utilizare

#### *Precauții speciale pentru utilizarea la animale*

Vaccinul Ruvac nu se administrează simultan cu alte produse medicinale. Progenii proveniți din scroafele vaccinate trebuie să ingereze o cantitate suficientă de colostru și lapte.

Boca

*Se recomanda vaccinarea animalelor clinic sanatoase.*

Tineretul porcin, scoafele/scrofitele/vierii de reproductie cu boli infectocontagioase, parazitare sau cu deficiente nutritionale si metabolice vor inregistra un raspuns imunologic necorespunzator.

Tineretul porcin, scoafele/scrofitele /vierii de reproductie dupa actiuni de transport, lotizari, transfer, vor inregistra de asemenea un raspuns imunologic necorespunzator.

La toate grupele si varstele de porcine la care vaccinul va fi administrat nu se vor aplica tratamente cu produse antibiotice, cu 3 zile anterior vaccinarii si timp de 7 zile dupa vaccinare.

Nu se recomanda vaccinarea la purcei proveniti din mame vaccinate in primele 21 de zile.

#### ***Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administreaza produsul medicinal veterinar la animale***

Inocularea accidentală cu acest produs a personalului operator necesita examen medical specializat. In caz de autoinjectare solicitați de urgență sfatul medicului prezentând prospectul produsului sau eticheta.

#### **4.6. Reacții adverse (frecventa și gravitate)**

Ocazional, la maximum 10% dintre animale, la locul de inoculare poate să apară un edem (cu diametru sub 5 cm), care se remite în 3-4 zile, iar la unele animale se poate înregistra o febră usoară (creșterea temperaturii cu 1-1,5°C), tranzitorie, timp de 1-2 zile. Dacă se observă reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

Frecventa reacțiilor adverse este definită utilizând urmatoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)

#### **4.7. Utilizare în perioada de gestație sau lactație**

Vaccinul se poate administra în perioada de gestație la varsta de 75 sau 95 de zile de gestație, dar nu se administrează la scoafele/scrofitele care au peste 100 zile varsta a gestației.

#### **4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare**

Nu sunt cunoscute.

#### **4.9. Cantități de administrare și cale de administrare a vaccinului**

Vaccinul se administrează pe cale intramusculară, în doză de 1 ml, în regiunea gâtului, în spatele urechii, indiferent de categoria de porcine, preventiv sau de necesitate. Resuspendarea conținutului liofilizat al unui flacon în diluantul livrat, 1ml diluant/doza vaccinală, funcție de numărul de doze înscris pe flacon.

Tineretul se vaccinează la vîrstă de 90 de zile, cu rapel la vîrstă de 120 de zile. Vierii, vierușii, scrofitele, scoafele din exploatațiile industriale se vaccinează de două ori pe an, în trimestrele I și III.

La porcii grași vaccinările de întreținere se fac din 6 în 6 luni.

Animalele din gospodăriile populației vor fi vaccinate de două ori pe an, la interval de 6 luni, cu vaccinări de completare lunare la tineretul care atinge vîrstă de 90 zile.

D  
E  
Joe



#### **4.10. Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caza**

Dupa administrarea unei supradoze nu s-au semnalat reacții locale sau generale la animalele vaccinate decat cele mentionate la punctul 4.6. (reactii adverse).

#### **4.11. Timp de aşteptare**

Zero zile.

### **5. PROPRIETATI IMUNOLOGICE**

La porcii vaccinati, produsul Ruvac induce sericonversia specifica a animalelor vaccinate. Progenii (purceii) sunt imunizati pasiv prin ingerarea de colostru si lapte care contine anticorpi specifici

Codul ATC vet: QI09AE01 Erysipelothrix rhusiopathiae

### **6. PARTICULARITATI FARMACEUTICE**

#### **6.1. Lista excipientilor :**

Coloid protector (stabilizator) PDZ 14T:  
Peptonă  
Dextran  
Sucroza  
Apă pentru preparate injectabile

#### **6.2. Incompatibilități majore :**

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar cu exceptia diluantului.

#### **6.3. Perioada de valabilitate:**

Perioada de valabilitatea a produsului medicinal veterinar asa cum este ambalat pentru vanzare (liofilizat): 9 luni

Perioada de valabilitatea după reconstituire conform indicatiilor: 2 ore.

#### **6.4. Precauții speciale pentru depozitare:**

A se păstrează la temperatura de 2-8°C, ferit de lumină și îngheț.

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

#### **6.5. Natura și compoziția ambalajului :**

Flacoane din sticla tip II/ PVC inchise cu dop de cauciuc, x 6 ml, x 10 ml, cu un conținut de 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

Cutii de carton cu 10 flacoane x 6 ml / 10 ml x 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

#### **6.6. Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deseu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate in conformitate cu cerintele locale.

**7. DETINATORUL AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE**

**PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A**

Str. Principală, nr.944,  
Filipești de Padure, jud. Prahova,  
Romania  
Tel: +4 021 220 69 20,  
Fax: +4 021 220 69 15  
E-mail: [office@pasteur.ro](mailto:office@pasteur.ro)

**8. NUMAR AUTORIZATIE DE COMERCIALIZARE**

150488

**9. DATA PRIMEI AUTORIZARI / REINNOIRII AUTORIZATIEI**

08.03.2001/ 14.07.2006/ 04.12.2015


**10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Februarie 2022

**INTERDICTII PENTRU VANZARE, ELIBERARE SI/SAU UTILIZARE:**

Produsul se eliberează numai pe baza de reteta veterinara.

Bote  
Bote



**INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRISE PE UNITATELE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

Flacoane din sticla tip II / PVC x 6 ml, 10 ml, cu un conținut de 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

**RUVAC** - vaccin viu atenuat liofilizat monovalent contra rujetului la porcine

**2. CANTITATEA DE SUBSTANTA ACTIVA**

Suspensie *Erysipelothrix rhusiopathiae*, tulpina VR2, atenuată, serotip 2a, minim  $10^{7.0}$  – maxim  $10^{7.5}$  UFC / doza

**3. CONTINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMAR DE DOZE**

Flacoane x 6 ml, 10 ml, cu un conținut de 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

**4. CALE DE ADMINISTRARE**

Intramuscular

**5. TEMPORALITATEA DE ASTEPTARE**

Zero zile

**6. NUMARUL SERIEI**

**7. DATA EXPIRARII**

Exp. lună / an.

Perioada de valabilitatea după reconstituire conform indicatiilor: 2 ore.

**8. MENTIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar

S.A.

Borcan

**INFORMATII MINIME CARE TREBUIE INSCRISE PE UNITATILE DE AMBALAJ SECUNDAR**

Cutii de carton cu 10 flacoane x 6 ml, 10 ml x 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

RUVAC - vaccin viu atenuat liofilizat monovalent contra rujetului la porcine

**2. DECLARAREA SUBSTANTELOR ACTIVE SI A ALTOR SUBSTANTE**

**Substanta activa :**

Suspensie *Erysipelothrix rhusiopathiae*, tulpina VR2, atenuată, serotip 2a, minim  $10^{7.0}$  – maxim  $10^{7.5}$  UFC / doza

**Excipienti:**

Coloid protector (stabilizator) PDZ 14T în raport ..... 3 : 1

**3. FORMA FARMACEUTICA**

Vaccin viu liofilizat.

**4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Cutii de carton cu 10 flacoane x 6 ml, 10 ml x 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

**5. SPECII TINTA**

Porcine (tineret porcin, scroafe, scrofite, vieri).

**6. INDICATIE (INDICATII)**

Cititi prospectul inainte de utilizare.

**7. MOD SI CALE DE ADMINISTRARE**

Vaccinul se administrează pe cale intramusculară.

Cititi prospectul inainte de utilizare.

**8. TEMP DE ASTEPTARE**

zero zile.

**9. ATENTIONARE (ATENTIONARI) SPECIALE (SPECIALE), DUPA CAZ**

Cititi prospectul inainte de utilizare.

**10. DATA EXPIRARII**

Exp. lună / an.

După reconstituire în diluant vaccinul se va utiliza în maxim 2 ore.

**11. CONDITII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A se păstra la temperatura de 2-8° C, ferit de lumină.

A nu se congela.

**12. PRECAUTII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE**

**SAU A DESEURILOR, DUPA CAZ**

Eliminare: Cititi prospectul produsului.

*Bogdan*

**13. MENTIUNEA "NUMAI PENTRU UZ VETERINAR" SI CONDITII SANI RESTRICTII  
PRIVIND ELIBERAREA SI UTILIZAREA, DUPA CAZ**

Se eliberează numai pe bază de rețeta veterinară.  
Numai pentru uz veterinar.



**14. MENTIUNEA "A NU SE LASA LA VEDEREA SI INDEMANA COPIILOR"**

A nu se lasă la vedere și indemana copiilor

**15. NUMELE SI ADRESA DETINATORULUI AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE**

**PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A**

Str. Principala, nr.944,  
Filipești de Padure, jud. Prahova,  
Romania  
Tel: +4 021 220 69 20,  
Fax: +4 021 220 69 15  
E-mail: [office@pasteur.ro](mailto:office@pasteur.ro)

**16. NUMARUL (NUMERELE)AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE  
150488**

**17. NUMARUL DE FABRICATIE AL SERIEI DE PRODUS  
<Serie> <Valabilitate>**

*Boca*

## PROSPECT

## RUVAC

**Vaccin viu, atenuat, liofilizat, monovalent, contra rujetului la porcine**

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICATIE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE:**

**Deținătorul autorizației de comercializare:**

**PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A.**

Str. Principala, nr.944,  
Filipești de Padure, jud. Prahova,  
Romania  
Tel: +4 021 220 69 20,  
Fax: +4 021 220 69 15  
E-mail: [office@pasteur.ro](mailto:office@pasteur.ro)

**Producător responsabil pentru eliberarea seriilor de produs:**

**PASTEUR FILIALA FILIPESTI S.A.**

Calea Giulești 333, București, România  
Tel: +4 021 220 69 20,  
Fax: +4 021 220 69 15  
E-mail: [office@pasteur.ro](mailto:office@pasteur.ro)

**2. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR:**

**RUVAC - vaccin viu atenuat liofilizat monovalent contra rujetului la porcine .**

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE**

1 doză contine:

**Substanța activă:**

Suspensie *Erysipelothrix rhusiopathiae*, tulipina VR2, atenuată, serotip 2a, minim  $10^{7.0}$  – maxim  $10^{7.5}$  UFC / doza

Excipient: Coloid protector (stabilizator) PDZ 14T în raport ..... 3 : 1

**4. INDICAȚII:**

Se utilizează pentru imunizarea activă a porcilor (tineret porcin, scroafe, scrofite, vieri) în vederea prevenirii mortalităților, semnelor clinice și/sau leziunilor specifice rujetului, și pentru imunizarea pasivă a progenilor scroafelor și scrofitelor vaccinate, în vederea reducerii mortalității și a semnelor clinice datorate infecției cu *Erysipelothrix rhusiopathiae* pentru primele săptămâni de viață.

Imunitatea se instalează la 21 zile și durează 6 luni.

**5. CONTRAINDICAȚII**

Vaccinarea cu Ruvac nu se va face la:

- animale cu boli infectocontagioase, parazitare sau cu deficiențe nutriționale și metabolice

- scroafele / scrofitele care au peste 100 de zile vîrstă a gestației  
- tineretul cu varsta sub 90 zile  
- animalele cărora li s-au administrat antibiotice cu 7 zile înainte de vaccinare  
Administrarea de antibiotice timp de cel puțin 7 zile după vaccinare.  
De asemenea nu se vor vaccina animalele după transport, lotizări, transfer.

## 6. REACȚII ADVERSE:

Ocazional, la maximum 10% dintre animale, la locul de inoculare poate să apară un edem (cu diametru sub 5 cm), care se remite în 3-4 zile, iar la unele animale se poate înregistra o febră usoară (creșterea temperaturii cu 1-1,5°C), tranzitorie, timp de 1-2 zile. Dacă se observă reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând urmatoarea convenție:

- Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)
- Frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale tratate)
- Mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale tratate)
- Rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale tratate)
- Foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate)

## 7. SPECII TINTĂ: porcine (tineret porcin, scroafe, scrofite, vieri).

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CĂI DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE :

Vaccinul se administrează pe cale intramusculară, în doză de 1 ml, în regiunea gâtului, în spatele urechii, indiferent de categoria de porcine, preventiv sau de necesitate.

Resuspendarea conținutului liofilizat al unui flacon în diluantul livrat, 1ml diluant/doza vaccinală, funcție de numărul de doze înscris pe flacon.

Tineretul se vaccinează la vîrstă de 90 de zile, cu rapel la vîrstă de 120 de zile

Vierii, vierușii, scrofitele, scroafele din exploatațiile industriale se vaccinează de două ori pe an, în trimestrele I și III.

La porcii grași vaccinările de întreținere se fac din 6 în 6 luni.

Animalele din gospodăriile populației vor fi vaccinate de două ori pe an, la interval de 6 luni, cu vaccinări de completare lunare la tineretul care atinge vîrstă de 90 zile.

## 9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

Flacoanele cu vaccin vor fi scoase din spațiul de depozitare (2 - 8°C) și aduse la temperatura de 18 - 22°C pentru reconstituire / suspendare și omogenizare.

În vederea asigurării omogenității suspensiei, flacoanele cu vaccin se vor agita înainte de vaccinare și în timpul vaccinării.

## 10. TIMP DE AȘTEPTARE:

Zero zile.

## 11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la temperatura de 2-8°C, ferit de lumină și îngheț.

A nu se utilizează după data expirării menționată pe ambalaj.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

## 12. ATENȚIONARI SPECIALE:

### Atenționări speciale

Nu s-au consemnat date privind răspandirea VR2 de la animalele tinta vaccinate la cele nevaccinate în timpul utilizării vaccinului pe specia tinta. De asemenea nu s-au consemnat date privind răspandirea tulpinii la alte specii.



### **Precăutii speciale pentru utilizare**

#### **Precăutii speciale pentru utilizarea la animale**

Vaccinul Ruvac nu se administreaza simultan cu alte produse medicinale. Progenii proveniti din scroafele vaccinate trebuie sa ingereze o cantitate suficienta de colostru si lapte.

Se recomanda vaccinarea animalelor clinic sanatoase.

Tineretul porcin, scroafele /scrofitele /vierii de reproductie cu boli infectocontagioase, parazitare sau cu deficiente nutritionale si metabolice vor inregistra un raspuns imunologic necorespunzator.

Tineretul porcin, scroafele /scrofitele /vierii de reproductie dupa actiuni de transport, lotizari, transfer vor inregistra de asemenea un raspuns imunologic necorespunzator.

La toate grupurile si varstele de suine la care vaccinul va fi administrat nu se vor aplica tratamente cu produse antibiotice, cu 3 zile anterior vaccinarii si timp de 7 zile dupa vaccinare.

Nu se recomanda vaccinarea la purcei proveniti din mame vaccinate in primele 21 de zile.

#### **Precăutii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale**

Inocularea accidentală cu acest produs a personalului operator necesita examen medical specializat. In caz de autoinjectare solicitați de urgență sfatul medicului prezentând prospectul produsului sau eticheta.

#### **Utilizare în perioada de gestație sau lactație**

Vaccinul se poate administra in perioada de gestatie la varsta de 75 sau 95 de zile de gestatiei, dar nu se administreaza la scoafele / scrofitele care au peste 100 zile varsta a gestatiei.

#### **Interacțiuni cu alte produse medicinale veterinare**

Nu sunt cunoscute.

#### **Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz**

Dupa administrarea unei supradoze nu s-au semnalat reactii locale sau generale la animalele vaccinate decat cele mentionate la punctul 4.6. (reactii adverse).

#### **Incompatibilități :**

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar cu exceptia diluantului.

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR DUPĂ CAZ:**

Medicamentele nu trebuie aruncate in ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

### **14. DATA LA CARE A FOST REVIZUIT PROSPECTUL**

Februarie 2022

## **15. ALTE INFORMAȚII:**

### **PREZENTARE**

Flacoane din sticla tip II/ PVC inchise cu dop de cauciuc, x 6 ml, 10 ml, cu un conținut de 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

Cutii de carton cu 10 flacoane x 6 ml / 10 ml x 5, 10, 25, 50, 100 și 200 doze.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informație referitoare la acest produs veterinar, vă rugăm să contactați deținătorul autorizației de comercializare.

