

## RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRIINAIRE

PREVENDOG 1,056 g collier médicamenteux pour chiens petits et moyens

### 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Un collier de 60 cm (26,40 g) contient :

#### Substance(s) active(s) :

Deltaméthrine.....1,056 g

#### Excipient(s) :

Dioxyde de titane (E171).....0,376 g

Charbon activé.....0,020 g

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

### 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Collier médicamenteux.

Collier gris.

### 4. INFORMATIONS CLINIQUES

#### 4.1. Espèces cibles

Chiens (0 - 25 kg) - pour chiens petits et moyens.

#### 4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Affections à parasites sensibles à la deltaméthrine.

Chez les chiens :

Prévention des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus* et *Rhipicephalus sanguineus*) grâce à un effet acaricide persistant pendant 6 mois.

Prévention des piqûres de phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) grâce à un effet répulsif (anti-gorgement) persistant pendant 12 mois.

Prévention des piqûres de moustiques (*Culex pipiens*) grâce à un effet répulsif (anti-gorgement) persistant pendant 6 mois.

#### 4.3. Contre-indications

En l'absence d'études, ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines.

Ne pas utiliser lors d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Ne pas utiliser chez les chats.

Ne pas utiliser chez les chiens présentant des lésions cutanées.

#### 4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Puisque le collier produit son plein effet après une semaine, il doit être préférentiellement placé une semaine avant que les animaux ne soient susceptibles d'être exposés à l'infestation.

Les tiques seront tuées et tomberont de l'hôte dans les 24 à 48 heures après infestation sans avoir pris de repas sanguin, mais l'attachement de tiques isolées après traitement ne peut être exclu. Ainsi, la transmission de maladies infectieuses par les tiques ne peut être exclue.

Dans des conditions défavorables, la transmission de maladies infectieuses par les phlébotomes ne peut pas être totalement exclue.

#### **4.5. Précautions particulières d'emploi**

##### Précautions particulières d'emploi chez l'animal

L'effet d'un shampoing sur l'efficacité du produit n'a pas été étudié.

##### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Une ingestion accidentelle de ce produit peut causer des effets indésirables dont des effets neurotoxiques. Conserver le produit dans l'emballage d'origine. Garder le collier dans le sachet jusqu'à utilisation.

Ne pas fumer, manger ou boire pendant la manipulation du collier. Tenir éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.

Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier ou le mettre dans la bouche. Se débarrasser immédiatement de tous restes ou parties coupées du collier. Se laver les mains à l'eau froide après avoir placé le collier.

En cas de contact accidentel avec la bouche ou en cas d'ingestion, demandez conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette.

Éviter tout contact prolongé avec le collier ou avec le chien portant ce collier. Cela comprend également le fait de partager un lit avec le chien portant le collier ; ceci est particulièrement important pour les enfants.

La deltaméthrine peut provoquer des réactions d'hypersensibilité (allergie) chez les personnes sensibles. Les personnes ayant une hypersensibilité connue à la deltaméthrine doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire et l'animal traité. Demandez conseil à un médecin en cas de réaction d'hypersensibilité.

##### Autres précautions

Bien que les contacts occasionnels avec l'eau ne réduisent pas l'efficacité du collier, la deltaméthrine est toxique pour les poissons et d'autres organismes aquatiques. Les chiens portant ce collier ne sont pas autorisés à se baigner dans les cours d'eau.

#### **4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Dans de rares cas, des réactions cutanées locales (prurit, érythème, perte de poils) au niveau du cou ou de la peau en général ont été observées, ce qui peut indiquer une réaction d'hypersensibilité locale ou générale.

Des modifications du comportement (par ex. léthargie ou hyperactivité) souvent associées à une irritation cutanée ont également été rapportées dans de très rares cas.

Dans de très rares cas, des symptômes gastro-intestinaux tels que des vomissements, de la diarrhée et de l'hypersalivation ont été observés.

Dans de très rares cas également, des troubles neuro-musculaires tels que de l'ataxie et des tremblements musculaires ont été observés. Les symptômes disparaissent habituellement dans les 48 heures qui suivent le retrait du collier.

Si l'un de ces symptômes apparaît, le collier doit être retiré. Le traitement doit être symptomatique car aucun antidote spécifique n'est connu.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)

- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

#### 4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

Les études de laboratoire sur des rats et des lapins n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes. L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie pendant la gestation. L'utilisation du médicament n'est pas recommandée pendant la gestation. Il peut être utilisé pendant la lactation.


#### 4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Ne pas utiliser avec d'autres antiparasitaires externes (pyréthrinoïdes ou organophosphorés).

#### 4.9. Posologie et voie d'administration

Un collier par chien. Le collier de 60 cm est à utiliser pour des chiens petits et moyens. Convient aux chiens ayant un tour de cou mesurant jusqu'à 48 cm.

Retirer le collier de l'emballage et décoller la bande de confort. Ajuster le collier au cou de l'animal sans trop le serrer. Deux doigts joints doivent pouvoir passer entre le collier et le cou du chien. Glisser l'extrémité du collier dans la boucle et couper la partie excédentaire en laissant 5 cm.



Ce collier a été conçu avec un dispositif de fermeture de sécurité (sécurité anti-étranglement). Dans le cas improbable où le chien serait coincé avec son collier, la force du chien sera suffisante pour élargir le collier afin de permettre une libération rapide.

#### 4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

En cas d'ingestion accidentelle du collier par le chien, contactez votre vétérinaire. Les symptômes d'intoxication suivants peuvent être observés: incoordination motrice, tremblements, hypersalivation, vomissements, rigidité de l'arrière-main. Ces symptômes persistent habituellement pendant 48 heures. En cas d'ingestion accidentelle, le propriétaire de l'animal doit contacter le vétérinaire et ne doit pas initier lui-même un traitement symptomatique ; le vétérinaire doit estimer la nécessité de mettre en place un traitement symptomatique.

#### 4.11. Temps d'attente

Sans objet.

### 5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Groupe pharmacothérapeutique : antiparasitaire à usage externe, insecticide et répulsif, pyréthrines et pyréthrinoïdes.

Code ATCvet : QP53AC11

#### 5.1. Propriétés pharmacodynamiques

La deltaméthrine, molécule de la famille des pyréthrinoïdes de synthèse, est caractérisée par son activité acaricide et insecticide. Agissant en modifiant la perméabilité des canaux à sodium, la molécule provoque une hyperexcitation, suivie d'une paralysie (effet de choc), de tremblements et de la mort du parasite.

La deltaméthrine a une action répulsive contre les phlébotomes, vecteurs de *Leishmania infantum* (protozoaire, agent de la leishmaniose).

## 5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques

La deltaméthrine est relarguée par le collier en continu dans le pelage et dans la couche grasseuse de la peau. La substance active diffuse depuis le site de contact sur la surface cutanée *via* la couche lipidique et dans le pelage.

L'absorption de la deltaméthrine par la peau est faible.

## 6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

### 6.1. Liste des excipients

Chlorure de polyvinyle  
Stéarate de calcium  
Huile de soja époxydée  
Adipate de diisooctyle  
Dioxyde de titane (E171)  
Charbon activé  
Triphénylphosphate  
Stéarates de calcium et zinc

### 6.2. Incompatibilités majeures

Sans objet.

### 6.3. Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 30 mois.

Durée de conservation après la première ouverture du conditionnement primaire : à utiliser immédiatement.

### 6.4. Précautions particulières de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.  
Conserver les sachets dans l'emballage extérieur.

### 6.5. Nature et composition du conditionnement primaire

Chaque collier est emballé dans un sachet scellé fait de polyéthylène terephthalate-aluminium-polypropylène.

Tailles d'emballages:

Boîte en carton ou métallique avec un sachet contenant 1 collier de 60 cm.

Boîte en carton ou métallique avec deux sachets contenant 1 collier de 60 cm.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### 6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait mettre en danger les poissons et autres organismes aquatiques.

**7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.  
LES CORTS, 23  
08028 BARCELONA  
ESPAGNE

**8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V541564

**9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

Date de première autorisation : 09/05/2019

**10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

08/07/2021

Délivrance libre.